Oecon.
384

Oec ~~284~~ 384

Oeconomia. hortorum cultura
H. varia 2A6c

~~Oec. agr. N. 230.~~

CATALOGUE HOLLANDOISE
TANT DES
ARBRES ET PLANTES
ETRANGERES,
QUE DES
RACINES ET OIGNONS
À FLEURS,

Qu'on vend au plus bas prix chez

W. VAN HAZEN,
H. VALKENBURGH,
ET COMP.

Fleuristes sur le Marendyk à Leyden en Hollande.

SECONDE EDITION,

Où on trouve aussi notées les noms communes qui portent les Arbres & Plantes, en France & en Angletterre.

TER BOEKDRUKKERYE,
Van VAN DAMME.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

EXPLICATION
Des Lettres & Marques de la Premiere Colonne regardant leur habitude.

A. 1. Signifie Arbres qui croissent les plus hautes.
A. 2. - - - - - - - du second rang.
A. 3. - - - - - - - du troisieme ordre.
A. 4. - - - - - - - du quatrieme ou plus bas rang.
F. - - - Arbrisseaux.
V. - - - Plantes grimpantes.
P. $\frac{1}{2}$. - - - - - - - poussants leur tieges ou verdures seulement à un demie pied d'hauteur.
P. 1. - - - - - - - croissant environ un pied d'hauteur.
P. 2. - - }
P. 3. - - } - - - - - qui poussent leur tieges ou verdure, environ deux, trois, quatre, &c. pieds, pendant l'Eté.
P. 4. &c }
B. $\frac{1}{2}$. - - - Oignons poussant leur tieges environ un demie pied.
B. 1. - - }
B. 2. &c. } - - - - Croissant Jusq'à un, deux &c. pieds d'hauteur.
R. $\frac{1}{2}$. - - - Racines, ou Pates, perdant leur verdure en hyver se levent environ l'hauteur d'un demie pied.
R. 1. - - - Racines, ou Pates, croissant Jusq'à, un deux &c.
R. 2. &c. pieds.

Les marques du zodiacq signifient environ le tems dans le quel ils fleurissent. Comme

♒ Fait connoitre qu'ils fleurissent, en Janvier.
♓ - - - - - - - Fevrier.
♈ - - - - - - - Mars.
♉ - - - - - - - Avril.
♊ - - - - - - - May.
♋ - - - - - - - Juin.
♌ - - - - - - - Juillet.
♍ - - - - - - - Aout.
♎ - - - - - - - Septemb.
♏ - - - - - - - Octob.
♐ - - - - - - - Novembr.
♑ - - - - - - - Decembr.
♌♐ - - - - de Juillet jusqu'à Novembr. &c.

☉ Signifie qu'ils fleurissent tout l'Eté ou bien la plus grande partie de l'Année.

† Signifie qu'ils portent de belles fleurs.

E X-

EXPLICATION

Des Caracteres de la Seconde Colonne Regardant leur traitement ou leur Culture.

a. Fait connoitre, Celles qui reſtent en grand air, ou en pleine terre ſans aucune Couverture.

b. Signifie, Celles qui reſtent en pleine terre, étant couvertes, de paille, de nattes, ou feuilles ſeches pendant l'Hyver.

c. — — qui peuvent etre conſerveés dans une ſerre ſans feu étant ſeulement gardées de la geleé.

d. — — qui reſtent auſſi dans une ſerre ſans feu, mais qui doivent etre poſées pres de fenetres, ou dans un Lieu ou ils peuvent recevoir le ſoleil & plus d'air frais.

e. — — qui doivent etre conſervées dans une ſerre un peu Rechauffée.

f. — — qui ont beſoin la meme Chaleur que les Ananaſſes.

g. — — qui doivent avoir la plus grande Chaleur.

o. — — Celles qui doivent reſter toute l'année dans les ſerres, ne pouvant ſouffrir l'inconſtance de notre Climat.

x. — — qui ont beſoin d'etre miſe au primtems, dans une ſerre remplie de tan pour les faire Croitre.

ſ. — — Celles a qui on doit donner tres peu de l'eau pendant l'Hyver.

ſſ. — — Celles a qui on ne doit pas abſolument donner de l'eau pendant l'Hyver.

* — — Plantes ou oignons d'afrique qui étant planté dans une Planche en pleine terre couverts avec de verres pendant l'Hyver & bien gardées pour toute gelée, croiſſent plus fort & fleuriſſent plus volontiers que quand ils ſont planté dans de pots & miſe en les ſerres.

LES LETTRES

Qui se trouvent derriere les noms denotent.

B. Boerhave, index alter Plantarum, Lugduni Batavorum, apud P. van der Aa, 1720

R. A. van Royen flore Leydensis Prodromus Lugduni Batavorum, apud S. Luchrmans, 1740

L. C. Linnæi, species Plantarum, Holmiæ, 1753

M. P. Miller Gardeners dictionary Sixth edition, London 1752

T. Z. J. Burmanni Thesaurus Zeylanicus, Amstelædami 1737

B. D. J. Burmanni Decades plantarum africanarum Amstelædami, 1738

T. Tournefort, Institutiones rei Herbariæ, Paris 1719

C. C. Commelinus, icones Plantarum Lugduni Batavorum, 1716

C. H. Horti Cliffortiani.

Ou on trouve ces Plantes aux nombres qui y sont ajoutes.

C A-

CATALOGUE DES ARBRES ET PLANTES ETRANGERES.

ABIES, en François, *Sapin*; English, *Fir tree.* Pinus. L.

Habitus	Cultuure	
A. 1.	a.	1. Taxi fol. Subtus argenteis, *picea alba Vulgo* B. 1. *pinus* L. 8.
A. 1.	a.	2. . . . . tenuiore B. 2, *picea rubra dicta*, *pinus* L. 10.
A. 1.	a.	3. . . . odoræ balsami gileadensis M. 7. *pinus* L. 9.
A. 1.	a.	4. Virg. fol. tenuiore odorato, *pinus am. conis minimus.*
A. 1.	b.	5. Fol. fasciculatis R. 3. *larix orientale* B. 2. T. *pinus* L. 6. Cedrus Libani Vulgo.
A. 1.	c.	6. Afr. fol. Cæseis, *pinus afr. Conis nigro maximo.*
A. 1.	c.	7. Eadem Conis minori.
A. 3.	a.	8. Minor virg. pectinatis fol. Conis parvis subrotundis M. 3.
A. 1.	a.	9. Picea fol. brevioribus Conis minimus M. 5.
A. 1.	a.	10. . . . . parvis biuncialibus M. 6.

ABRUS.

V.	g. o.	1. R. pag. 534. *Glycine* L. 5.

ABSINTHIUM, François, *Absinthe*; Englisch, *Worm-wood.* Artemisia L.

A. 4. ♎	c.	1. Orient. frutesc. in canum amplo fol. tenuissimo, diviso, B. 2. *artemisia* L. 1.

Habitus	Cultuure	
P. 2. ♍	a.	2. Ponticum B. 3. *artemisia* R. LL. 2.
P. 2. ♍	a.	3. . . . . . tenui fol. incanum B. 7. *artemisia* R. 3. L. 9.

ACACIA Fr. *Casie*, Eng. *Egyptianthorn.*

A. 1. ♌	a.	1. Amer. abruæ fol. spinis triplici donato B. 8. *gleditsia* L. 1.
A. 1. ♌	a.	2. . . . . triacanthos, capsula ovali M. 2. *gleditsia* L. 2.
A. 4. ♎ †	e.	3. Afr. fol. parvis duplicato pinnato flore luteo globoso odorato.
A. 4. ♍ †	e.	4. Vera fl. luteo odorato B. 1. *mimosa* R. 8. L. 31.
A. 2.	e.	5. Ægyptiaca fl. albo, *mimosa* R. 3.
A. 3.	e. o. x.	6. Amer. fol. amplissimo duplicato pinnato non spinoso.
F. ♍	e. o.	7. . . . . . non Spinosa, fol. tenuiss. fl. globoso albo M. 16.
A. 2. ♍	e. o.	8. . . . . flore globoso albo M. 13. *mimosa* R. 13.
A. 3.	e. o. x.	9. Similis mexicana, spinis Cornibus similis B. 4. *mimosa* R. 2. L. 36.
A. 2.	e.	10. Uti No. 5. flore Luteo, *mimosa* L. 21.

ACANTHUS, Fr. *Acante*, Eng. *Bear'sbreech.*

P. 1. ♋ †	b.	1. Sativus R. & L. 1.
P. 1. ♋ †	b.	2. Rarioribus & brevioribus aculeis munitis B. 2.
P. 1.	b.	3. Fol. pinnatis aculeatis R. & L. 2.

ACER, Fr. *Erable*, Eng. *Maple.*

A. 1.	a.	1. Platanoides fol. Eleg. Varieq. M. 8.
A. 1.	a.	2. Virgin. fol. trifidis & quinquifidis B. 5. L. 9.
A. 1.	a.	3. Fol. palmatis om. max. Caule rubente M. 9. *opalus italorum.*
A. 2.	a.	4. Amer. Sacharifera L. 4.

5. Pla-

Habitus	Cultuure	
A. 1.	a.	5. Platanoides, L. 5.
A. 2.	a.	6. Amer. fol. subtus arg. floribus multis, coccineis, L. 3.
A. 1.	a.	7. Majus fol. Eleg. Variegato, M. 2.
A. 2.	a.	8. Virg. fol. majoribus subtus argenteis viridis splendento, M. 4.

ACHILEA, Fr. *Mille-feuille*, Eng. *Milfoil.*

P. 2. ♌ ↮ †	a.	1. Fol. Eleg. Varieg. *millifolium*, B. 15.
P. 2. ♌ ↮ †	a.	2. . . pinnato fl. rubro, L. 14. B.
P. 1. ♌ ↮ †	a.	3. . . pinnatifidis Villosis fl. aureo, L. 4. R. 2. *millifolium tomentosum*, *B*. 9.
P. 2. ♌ ↮ †	b.	4. . . pinnatis duplicatis fl. aureo, *millifolium*, B 7.
P. 2. ♌ ↮ †	b.	5. Eadem fl. Sulphureo, *millifolium*, *B*. 8.
P. 1. ♌ ♎ †	b.	6. Fol. pinnatis fl. aureo, R. 6.
P. 1. ♌ ♎ †	b.	7. . . . . foliolis ovatis, R. 12. L. 17.
P. 1. ♌ ↮ †	a.	8. . . lanceolatis, R. 10. L. 2. *ageratum odoratum*, B. 2.
P. 2. ♌ ♍ †	a.	9. . . integris, R. 7. L. 10. *ptermica*, *B*. 1.
P. 2. ♌ ♍ †	a.	10. . . . . . fl. pleno, L. 10. β. *ptermica*, *B*. 2.
P. 1/2. ♉ ↮ †	b.	11. . . planis villosis nitidis, R. & L. 9.
P. 1 ♌ ↮ †	a.	12. . . lanceolatis dentatis, R. 8. *ptermica*, *B*. 6.
P 4 ♌ ↮ †	a.	13. Maxima umbella alba, L. 11.
P. 1. ♌ ♍ †	c.	14. Duplicato pinnato tomentoso, R. 12. *ptermico santoline fol. T.*
P. 1. ♌ ♍ †	b.	15. . . . pinnato L. 6.
P. 2. ♌ ↮ †	a.	16. . . . . fl. albo, L. 14.

A C H Y R A N T E S.

F. ♁	e.	1. Caule erecto, L. 1. *amarantus siculis*, *B*. 15.
F.	e.	2. . . . . . fol. atro puniceis.
F. ♁	c.	3. Floribus purpurascentibus lappæceis, L. 2.

Aco-

Habitus	Cultuure	
		ACONITUM, Fr. *Aconit ou Casque*, Eng. *Wolf's bane.*
B. ♒ †	a.	1. Hyemale M. *belleborus*, *R.* 4. *L.* 1.
P. 3. ♌	a.	2. Lycoctonum luteum, R. & L. 1.
P. 3. ♌	a.	3. Luteum majus ampliore Caule, B. 2.
P. 5. ♌ †	a.	4. Cæruleum, B. 5. R. 3.
P. 2. ♋	a.	5. Salutiferum, L. 5.
P. 5. ♌ †	a.	6. Fl. ex Cæruleo & albicante Var. B. 7.
P. 5. ♌ †	a.	7. Cærůleo purp. maximo, L. 3.
P. 5. ♌ †	a.	8. Oblongo flore intensiore Cæruleo.
		ACORUS, Fr. *Masse*, Eng. *Sweet rush.*
R. 3. ♋	a.	1. Verus, *Calamus aromaticus*, L. 1.
		ACRIVIOLA, Eng. *Indian Crets.*
V. ♂ †	e.	1. Flore pleno, *tropeolum* L.
		ACTÆA, Fr. *Christophoriane*, Eng. *Baneberries.*
P. 2. ♍	a.	1. Caule inermi, L. 4.
P. 5. ♍	a.	2. Racemis longissimus, L. 2.
		ADHATODA, Eng. *Mallabar-nut or-snap tree.*
A. 3. ♍	c.	1. Fl. galea Concava B. 1. *Justitia*, *R & L.* 1.
A. 4. ♍	e.	2. Folio saligno B. 2. *Justitia*, *R.* 2. *L.* 4.
F. ♌ ♑ †	e *o.*	3 Spica longiss. fl. reflexo, T. Z. *Justitia L.* 2.
		ADIANTHUM, Fr. *Capillaire*, Eng. *Maidenhair.*
P. ½.	b.	1. Ramosum pediculis Lucidis & nigris, *R.* 2. L. 14
		ADONIS, Eng. *Bird's-eye.*
P. 1. ♉ †	a.	1. Hellebori radice bubthalmi flore, L. 2.
		ÆSCHYNOMENE.
F.	e. *o. x.*	1. Caule Lævi, R & L. 4.

Agave v. aloe amer.

Æsculus v. Castanea equina. Pavia.

AGRI.

Habitus	Cultuure	
		AGRIMONIA, Eng. basterd *Agrimony*.
P. ½. ♊	a.	1. Fol. caulinis ternatis R & L. 2.
		ALATERNOIDES.
A. 4. ♏♉†	d.	1. Afr. Erice fol. fl. albicante muscoso, mas B. 1. *phylica R & L.* 1.
A. 4. ♑	c.	2. Telephi Legitimi fol. mas, *Clutia L.* 1.
A. 4. ♑	c.	3. Lauri ferrato folio B. 3. *Celastrus R.* 3. *Cœanothus L.* 3.
A. 4. ♏♉†	d.	4. Ut N°. 1. feminifera.
		ALATERNUS, Fr. *Alaterne*, Eng. *Ever-green privet.*
A. 3. ♉	b.	1. Hispanica B. 1. mas. *Rhamnus R.* 8. *L.* 4.
A. 3. ♉	b.	2. Latefolio ex aureo & Viridi Varieg. B. 2. M. 2.
A. 4. ♉	b.	3. Minore fol. B. 4. M. 6. *phillyrea media L. syst. natur.*
A. 4. ♉	b.	4. Seu phillyrea fol. ex luteis varieg. B. 6.
A. 4. ♉	b.	5. . . . . albo var. B. 7.
A. 3. ♉	b.	6. Ut N°. 1. fœmina.
A. 4. ♉	b.	7. Ut N°. 3. fol. profundo serrato M. 3.
		ALCEA, Eng. *Vervain-mallow.*
F. ♂ †	d.	1. Afr. fol. grossulariæ glabra fl. parvo rubro B. 13. *malva R.* 3.
F. ♂ †	d.	2. . . . amplo hirsuto fl. rubro *malva L.* 6. *β.*
F. ♂ †	d.	3. . . . amplissimo fl. amplo kermosino M. 8.
P. 2. ♌♏†	a.	4. Vulgaris major fl. Candiore B. 2. *malva L* 13.
P. 3. ♌♏†	a.	5. . . . fl. ex rubro roseo B. 2. *malva R.* 6.
F. ♍	e.	6. Afr. alnii fol. fl. parvo Luteo.
F. ♂ †	d.	7. . . folio amplo hirsuto fl. roseo magno, *malva L.* 6. *γ.*

Habitus	Cultuure	
		ALCHIMILLA, Fr. *Pié de Lion*, Eng. *Ladies-mantle.*
P. ½ ♊ ♄	a.	1. Alpina pubescens minor B. 2. L. 2. *ß.*
P. ½. ♊ ♄	a.	2. Fol. digitatis argentea R & L. 2.
P. ½. ♊ ♄	a.	3. . . palmatis L. 1.
		ALKEKENGI, Fr. *Coqueret*, Eng. *Winter Cherry.*
P. 1. ♉ ♄	a.	1. Officinarim *B.* 1. *physalis R.* 3. *L.* 5.
P. 1. ♌ ♄ †	e.	2. Curassav. fl. viete sulphureo fundo purp. B. 8. *physalis R.* 2. *L.* 3.
P. 1. ♌ ♄	d.	3. Bonariensis bacca turbinato, *physalis R & L.* 4.
F. ♀	e.	4. Fruticoso fructu parvo B. 7. *physalis R & L.* 1.
		ALLIUM, Fr. *Ail*, Eng. *Garlick.* add. Moly
P. 1. ♋ ♏ †	a.	1. Montanum fol. narcissi maius umbella purpureo M. 11.
P. 1. ♋ ♏ †	a.	2. . . . . minus umbella purpureo M. 14.
P. 2. ♎	a.	3. Sativum alterum L. 10.
		ALÖE.
P.	c. *f.*	1. Amer. maior, B. 5. R. 1. *agave L.* 1.
P.	c. *f.*	2. . . . . . . fol. ex argenteis striatis.
P.	c. *f.*	3. . . . . aureo striato Elegantissimo.
P.	e. *o. f.*	4. . . . sobolifera B. 7. *agave L* 2.
P.	e. *f.*	5. . . . . amer. fol. longissimo & angustissimo B. 6. *ex vera Cruce Maior.* M. 4.
P.	e. *f.*	6. . . . . . . fol. glauco spinoso B. 8. M. 3. *ex vera Cruce minor tuberoso.*
P.	e. *f.*	7. . . . . . viridi dicta B. 10. R 8. *agave L.* 4.
A.	d. *f.*	8. . . . . . . folio Jaccæ arborescens B. 45. *yucca L.* 2.
A.	c. *f.*	9. . . . . . . draconis fol. serrata B. 11. *Cordylline R.* 2. *jucca L.* 3.

10. Can-

Habitus	Cultuure	
A.	e. *o. ſ.*	10. Americana Cannæ indicæ folio.
P. ʒ. ♎ †	c.*	11. Africana fol. longiſſ. & anguſtiſſ. fl. luteis B. 43. R. 8. L. 9. *iris uvaria Vulgo.*
P. ʒ. ♎ †	c.*	12. Eadem in omni parte maioribus B. 44.
P.	e. *o. ſ.*	13. Afr. Caulefc. fol. magis glaucis C. fig. 44.
A.	d. *ſ.*	14. . . . . glaucis B. 21. *aloe arboreſcens vulgo.*
P.	d. *ſ.*	15. . . . . glaucis breviſſ. Caulem amplect B. 15.
P. ♍ †	d. *ſ.*	16. . . fol. glaucis, margine & dorſi ſuperioribus ſpinoſis fl. rubro B. 18.
A.	d. *ſ.*	17. . . Caulefc. fol. Craſſo obſcure viridi, B. 39
A.	d. *ſ.*	18. . . eadem, ſed in omni parte Craſſioribus.
A.	d. *ſ.*	19. . . Caulefc. fol Craſſo brevi obſcureviridi.
P.	d. *ſ.*	20. . . . fol. ſpinoſis in dorſi maculis albicantibus notato.
P.	d. *o. ſ.*	21. . . fol. magis glaucis Caulem amplectentibus in margine & dorſi verrucoſis.
P. ♉ †	d. *ſſ.*	22. . . breviſſ. & Craſſiſſ. ſolio, B. 2. R. 12. L. 6.
P. ♌	e *o. ſ.*	23. . . humilus triang. atro viridis verrucoſis.
P. ♉ †	d. *ſ.*	24. . . . ſpinis inermibus & verrucoſis, B. 23.
P. ♉ †	d. *ſ.*	25. . . . . verrucoſis, opſita R. 14.
P. ♉ †	d. *ſ.*	26. . . . . fol. ex albo & viridi varieg. R. 11. L. 2.
P. ♌	d. *ſ.*	27. . . . fol. triang. glabro, ætro viridis *ex ſemen margaritifera degener.*
P. ♉ †	d. *ſ.*	28. . . Caulefcens fol. amplexi caulibus in margine & in dorſo ſpinoſo fl. amplo rubro.
P. ♉	e. *o. ſ.*	29. . . humilus ſpinis herbaceis L. 8. ♂.
P. ♍	d. *ſ.*	30. . . . . margaritifera major, B. 31.
P. ♍	d. *ſ.*	31. . . . . . media, B. 31.

 32. Afr.

Habitus	Cultuure		
P. ♍	d. *ſ.*	32.	Afr. humilus margaritifera minor, B. 26. L. 8. β.
P. ♍	d. *ſ.*	33.	. . . . maxima in dorſo-ſolo verrucoſo.
P. ♍	d. *ſ.*	34.	. . . humilus margaritifere minima fol. multo Longioribus B 27. L. 8 γ.
P. ♑	d. *ſ.*	45.	. . . erecta triangularis & triangulari folio B. 32. R. 10. L. 7.
P. ♑	d. *ſ.*	36	. . . eadem Caule & folio gracilior.
P. ♊ †	d. *ſ.*	37.	. . . erecta rotnndi fol. parva, B. 33. R. 9. L. 5.
P. ♌	d. *ſ.*	38.	. . . minima atro viridis ſpinis herbaceis, B. 40. R. 13. L. 8 ε.
P. ♉	d. o *ſ.*	39.	. . . . . pallide viridis & non ſpinoſis.
P. ♉ †	d. o. *ſ.*	40.	. . . abores: montana plicatili fol. B. 34. L. 3. ε.
P. ♋ †	d. *ſ.*	41.	. . . fol planis Conjugatis Carrinatis verrucoſis.
P. ♋ †	d. *ſ.*	42.	. . . fol. longis Conjugatis margaritif. fl. rubro Eleg. B. 38.
P. ♋ †	d. *ſ.*	43.	. . . fol. planis Conjugatis fl. Corallini Colore B. 36. L. 3. δ.
P. ♋ †	d. *ſ.*	44.	. . . eadem fol. Eleg. ſtriato.
P. ♋ †	d. *ſ.*	45.	. . . fol. planis Conjug. maculis albicante notato fl. rubro B. 35.
P. ♋ †	d. *ſ.*	46.	. . . fl. rubro, fol. triangulari verrucoſis, B. 25. L 3. β.
P. ♋ †	d. *ſ.*	47.	. . . . maculis albicantibus ab utraque parte notato B 37.
A.	d. o. *ſ.*	48.	. . . arboreſcens fol. Cylindraceis cinereis margine ſpinoſis.
P. ♍ †	d. *ſ.*	49.	. . . Vulgaris B. 1. R. 3. L. 1. *.
P.	d. *ſ.*	50.	. . . Vulg. ſimilis maior maculis albis picta B. 2.
P. ♍ †	d. *ſ.*	51.	. . . vera minor B. 3. ſuccotrina fiore phœniceo vulgo L. 1. ξ.
P.	d. *ſ.*	52.	. . . Caballina.
P.	d. *ſ.*	53.	. . . . . . maior.

54. Zey-

Habitus	Cultuure	
P.	d. *s.*	54. Zeylanica pumila fol. varieg. B. 42. R. 7. L. 4. æ.
P. ♎ †	f. *ss. o.*	55. Guëneënsis fol. ex viridi & atro Undulato Var. B. 41. R. 6. L. 4. β.
P. ♊ †	d. *s.*	56. Afr. Caulescens. fol. amplexi caule, Utriumpque parte Verrucosis & Spinosis, fl. magno rubro.
P. ♊ †	d. *s.*	57. Afr. humilis spinis inermibus & valde Verrucoso fl. rubro, C. fig. 46.
P. ♌	d. *s.*	58. . . . . margaritifera om. minimum fol. acutiss. exeunte.
P. ♌	d. *s.*	59. . . . . . media, pallidi viridis.
P.	d. *s.*	60. . . . . fol. lingui formi, omnium minimum.
P. ♌ †	d. *s.*	61. . . . . latissimo, valde maculato.
P. ♌ †	d. *s.*	62. . . . . obtusiore ætroviridis splendento.
P.	e. *o. s.*	63. Americ. sobolifera latifolia maximo, *agave*
P. ♊ †	d. *s.*	64. Afr. Erecta, rotundo folio acutissimo exeunte verrucoso.
P.	e. *o. s.*	65. Amer. minor fol. lucidis viridis, *agave.*

ALTHÆA.

Habitus	Cultuure	
A. 3. ♌ †	c.	1. Frutescens. bryoniæ fol. B. 7. *Malva R.* 7. *L.* 5.
A. 3. ♌ †	c.	2. Maritima arbor veneta, B. 9. lavatera R. & L. 1.
A. 4. ♍ †	a.	3. Vel *ketmia Syrorum fl. albo* M. 3.
A. 4. ♍ †	a.	4. . . . . . purpureo M. 2.
A. 4. ♍ †	a.	5. . . . . . rubro M. 1.
A. 4. ♍ †	a.	6. . . . . . roseo.
A. 4. ♍ †	a.	7. . . . . . Cæruleo.
A. 4. ♍ †	a.	8. . . . . . ex albo & rubro Variis M. 4.
A. 4. ♍ †	a.	9. . . . . . purp. fol. Eleg. Varieg. M. 5.

(3–7: Hibiscus L. 9.)

Habitus	Cultuure	
A. 4. ♌ ⇹ †	o.	10. Fruticoso fol. cordato integerrimo fl. amplo roseo *Lavatera L.* 4
A. 4. ♍ †	e.	11. . . . fol. quinquifido dentato fl. roseo, *Lavatera L.* 3.

ALYSSUM, Eng. *Madwort.* add. Lunaria.

P. 1. ♊ †	a.	1. Fol. lanceolatis integris R. 6. L. 4.
P. 1. ♊ †	a.	2. Eadem fol. Eleg. Varieg.
P. ½. ♊ †	a.	3. Alpinum hirsutum Luteum B. 17. draba R. 2. L. 1.
P. 1. ♊ †	a.	4. Fol. lanceolatis repando dentatis L. 8.
P. 2. ♋	a.	5. Caule Erecto fol. lanceolatis incanis L. 5.

AMARANTOIDES. (H)

F.	e.	1. Fruticosis Caule erecta, *gomphrena L.* 2.

AMARYLLIS, Fr. *Lis-narcisse*, Eng. *Lily-daffodil.*

B. ♒	a.	1. Spatha uniflora R. & L. 1. *lilionarcissus luteo autumn. T.*
B. ♊	b.	2. . . . . R. & L. 2. *lilionarcissus ind. fl. ex albo exterius rubento T.*
B. ♈ ♋ †	e. ss. x.	3. . . . . R. & L. 3. *lilionarcissus fl. sanguineo nutante.*
B. ♍ †	d.*	4. . . . . R. 4. L. 5. *linionarcissus rutilo flore B.* 3.
B. ♍ †	d.*	5. . . . . suaviter rubento, petatis undulatis.
B. ♊ †	e. ss. x.	6. . . . . R. 5. L. 4. *lilionarcissus fl. incarnato funde ex luteo albescente B.* 4.
B. ♎ †	d.*	7. . . . . omnium maxim fl. albescente.
B. ♎ †	d.*	8. . . . . R 7. *lilionarcissus fl. niveo externe purpures stiato B.* 5.
B. ♎ †	d.*	9. . . . . fl. ex albo & purpurascente mixto.
B. ♎ †	d.*	10. . . . . L. 8. *Brunswichia dicta.*
B. ♎ †	d.*	11. . . . . pumila umbella sphæracephalosus.

12. Spa-

Habitus	Cultuure	
B. ♎ †	d.*	12. Spatha multiflora magna fl. albicante & ſuave rubento ſtriato.
B. ♎ †	d.*	13. . . . . . fol. Ciliato, L. 9.
B. ♎ †	d.*	14. . . . . . ut No. 12. ſed in omni parte minoribus & pallidioribus.

AMBROSIA, Fr. *Ambroſie*,

F. ♍	d.	1. fruticoſo fol. multipartitis odoratis.

AMOMUM, Eng. *Ginger.*

R.	f.ʃʃ.o.x.	1. Spica ovata R. 1. *zinziber anguſtiori fol. L.* 1.
R.	f.ʃʃ.o.x.	2. . . . . oblongo R. 2. *zinziber latifolium* L. 2.

A M O R P H A.

F. ♎ †	a.	1. Fruticoſa R & L. barbajovus floſculus purpurpu: H. C. tab. 19. *adde Barba Jovis n. 3.*

AMYGDALUS, Fr. *Amandier*, Eng. *Almond tree.*

F. ♉ †	a.	1. Nana, R. L. 3.
F. ♉ †	a.	2. . . . . flore pleno, *Perſica M.* 2.
A. 3. ♉ †	a.	3. Sativa fl. albo M. 4.

AMBARUN SPIRANS.

O. F. ♍	d.	1. Sive anthoſpermum mas. R: H. C. tab. 27.

ANACAMPSEROS, Fr. *Orpin*, Eng. *Roſe-root.*

P. 2. ♍ †	a.	1. Purpurea *B.* 8. *ſedum L.* 2. *β*.
P. 2. ♍	a.	2. Fl. pallide rubello, B. 7. *ſedum L.* 2.
P. 1. ♊	a.	3. Radice roſam ſpirante majus, B. 10. } *rhodiola L & R.*
P. 1. ♊	a.	4. . . . . . . minus, B. 11. } *rhodiola L & R.*
P. ½. ♊	a.	5. Semper virens fl. purp. B. 12. *ſedum L.* 3.

ANAGALLIS, Fr. *Mouron*; Eng. *Pimpernel.*

P. 1. ♁ †	d.	1. Cæruleo B. 4. fol. indiviſis L. 2. *monelli dicta.*

Habitus Cultuure

ANAGYRIS, Fr. *Bois puant*, Eng. *Stinking bean-tresoil.*

A. 3. ♌ † c. 1. Fætida, R & L.

ANANAS, Eng. *pine-apple.*

P. f.s.o.x.
1. Fol. vix ferrato. B. 5. *non spinosa* M. 3.
2. Fructu ovato Carne albidæ, M. 1.
3. . . . pyramidato, ex viridi flavescente M. 6.
4. Fructu pyramidato, carne aurea M. 2. *bromelia* L. 1. β.
5. . . . ovato Carne rubra, *ex malacca dicta.*
6. Silvest. brasiliana *karatas* M. *Bromelia L.* 3.
7. Amer. Sylvef. altera minor β. 3. *Pinguindicta.*
8. Lucido Virens non Spinosa, M. 4. *bromelia* L. 1. δ.
9. Silvestris Caraibiensis latifol. Spinosa, viridi Lucens.
10. Karatas dicta, fructu hirsuto.
11. . . . . . . acerrimo.
12. . . . . . . dulce.

ANAPODOPHYLLON, Eng. *May-apple.*

P. ½. ♉ † a. 1. Canadensis, B. *podophyllon* R & L.

ANEMONE, Eng. *Wind flower.* add Pulsatilla. adde Anemonoid.

P. 2. ♌ a. 1. Virg. fl. albo R. 2.

R. 1. ♉ † a. 2. Hortensis latifolio fl. purpurascente B. 3.

R. 1. ♉♏ † b. 3. Hortensis fol. multifidis fl pleno d'ont on trouve Chez nous, une Collection de plus que 300 Especes en toutes sortes des Couleurs, & d'un beaute acheve.

ANEMONOIDES, Eng. *Wood-anemony.*

R. ½. ♉ † a. 1. Flore albo pleno B. 10. *Anemone R.* 3. *L.* 15.

R. ½. ♉ a. 2. . . . luteo bino B. 9. *anemone R.* 3. *L.* 17.

R. ½. ♉ † a. 3. . . . pleno purpurascente, B. 3.

R. ½. ♉ † a. 4. . . . fl. majore intensiore Cæruleo, B. 4.

c.49

inun
embarn
piraas.

Jovi
i. Mill. 4

Habitus	Cultuure	
		ANEMONOSPERMOS, vel ARCTOTIS,
F. ♂ †	d.	1. Fol. Jacobæa fl. luteo extus puniceo B. 1. *arctotis L.* 4.
F. ♂ †	d.	2. . . Cardui benedicti, fl intus albicantibus.
P. ½. ♌	d.	3. . . plantaginis B. 3.
P. 1. ♂ †	d.	4. . . cordato Lanuginoso.
F. ♂ †	d.	5. . . Jacobæa tenuiter lacineato fl. auranteo pulcherrimo, *arctotis R.* 2. *L.* 3. *β.*
F. ♂ †	d.	6. . . Jacobæa fol. fl. intus albis extus purpurasc.
P. ½. ♂ †	d.	7. . . & facie taraxici incanis, *arctotes R.* 4.
P. ½. ♂ †	d.	8. . . rigidis, infra cinereis fl. amplo aureo majulis ex punicante & albo insignitio M. 7. Jc 49
F. ♀ †	d.	9. . . Jacobæa, ut No. 4 sed toto incano.
P. ½. ♂ †	d.	10. Humillima fol. infimus Cordatis, proxime pinnato fl. luteo, *arctotis L.* 1.
		ANGELICA, Fr. *Angelique.*
P. 2. ♌.	a.	1. Sativa L. 1.
		ANONA.
A. 2.	f. o. x.	1. Fol. lanceolatis R. 3. Guanabanus, M.
A. 2.	f. o. x.	2. . . lauro Cerasi.
A. 3.	d.	3. Virg. fructi bifido.
		ANTHOLYZA.
B. ♋ †	d.*	1. Stamine unico declinato L. 1.
B. ♋ †	d.*	2. Fl. Eleg. Coccineo L. 2. *Cunonia.* Mill. 113. ANTHOSPERMUM v. ambarum pirans.
		ANTIRRHINUM, Fr. *Musle de veau*, Eng. *Calves snout.*
P. 1. ♋	d.	1. Fol. ovato serrato L. 27.
P. 1. ♋ ⇸ †	b.	2. . . angusto Linearia fl. rubro ricto luteo.
P. 1. ♋ ⇸ †	c.	3. . . . . . Elegantiss. Varieg. B. 11.
P. 3. ♌ ⇸ †	a.	4. . . linearibus sparsis, fl. purp. L. 9.
P. ½. ♂ †	d.	5. . . angusto, bætica fl. atro rubento L. 8.

ANTHYLLIS v. Barba Jovi.
3. ANTHOLYZA f. linear. [illegible] fl. albi. Mill. 40

Habitus	Cultuure	
P. 3. ♌ ↔ †	a.	6. Ut N°. 4. fl. pallide purp.
P. 1. ♌ ♎ †	a.	7. Vel linaria lutea fl. majore L. 21.

APIOS, Eng. *Knobbed-rooted vetch.*

V. R. ♍ †	a.	1. Americana Cornutii B. *Glycine L.* 1.

APIUM, Fr. *Persil*, Eng. *Parsley.*

P. 2. ♍	b.	1. Macedonicum B. *bubon L.* 1.
P. 3. ♍	a.	2. Pyrenaicum thapsiæ facie T.
P. 4. ♍	c.	3. Dulce; Celleri dictum, fol. Eleg. Varieg.

APOCYNUM, Fr. *Apocin*, Eng. *Dogs-bane.*

P. 1. ♋ ♏ †	a.	1. Fl: lilii Convalli B. 10. R & L. 1.
P. 3. ♌ †	a.	2. Canadensis Erectum, fl. rubicundis, B. 5. *asclepias R.* 5. *L.* 8.
F. ♁ †	e.	3. Amer. fl. umbello auranteo, B. 17 *asclepias*, *R.* 7. *L.* 9.
P. 2. ♌ †	a.	4. Nova angliæ radice tuberosa, floribus auranteis *asclepias* R. 6. L. 18.
P. 4. ♌ †	a.	5. Latifolium incanum fl. obsoleto purpurascente B. 1. *asclepias* R. 4. L. 3.
F. ♁ †	d.	6. Afr. fol. salice lato, fl. albo B. 15. *asclepias*, *R.* 3.
F. ♁ †	d.	7. . . . . . angusto, fl. albo B. 16. asclepias, L. 14.
F. ♌	d.	8. Caule recto arborea fol. ovatis acutis, R. 3. L. 4.
V. ♌ †	d.	9. Afr. scandens vincæ pervincæ fol. subincanis B. 18. *Cyranche R.* 6 *periploca L.* 3.
F. ♌	d.	10. . . subrotundo, folio, fl. albo B. 11.
A. 4. ♑ †	d.	11. . . fruticos. late fol. fructu geminæ sulcato spinoso, B. D. 2.
P. 1. ♌	a.	12. Virg. androsemi folio, fl. albo,
V.	d.	13. Afr. vincæ pervincæ fol, oppositis, caule volubili.
P. 2. ♌	d.	14. Pensylvanicus fl. albo.
F. ♁ †	e.	15. Ut N°. 3. flore albo.
V. ♌	c.	16. Fol. Cordiformi fl. albicante, *Cynanche L.* 1.
V. ♌	c.	17. Caule volubili fol. Cordato Lanceolatis.

AQUI-

Habitus Cultuure

AQUIFOLIUM, Fr. *Houx*, Eng. *Holly*.

A. 4. b. 1. Carolinienſis fol. ovato lanceolato dentato, M. 33.

a. 2. Fol. echinata ſuperficie, B. 10. M. 6.

a. 3. . . . . . . Eleg. ex albo varieg. M. 9.

a. 4. Latifolio, ſpinis & limbus argenteis, M. 5.

b. 5. Foliis minoribus ſpinis & limbus argenteis, M. 5.

a. 6. Lauri fol. ſpinis viduis.

a. 7. Lauri fol. Eleg. varieg. ſpinis & limbus aureis.

a. 8. Anguſti folio ſpinis & limbus aureis.

a. 9. . . . . . aureis ſpinis & limbus viridis, baccis rubro.

a. 10 Latifolio ſpinis & limbus aureo fructu rubro.

b. 11. Latifolio ex viridis & aureis Elegantiſſ. variegato, baccis luteis.

a. 12. Latifolio baccis aureis, M. 2

a. 13. Fol. ſubrotundo, ex albo Eleg. varieg. M. 11.

b. 14. Fol oblongo ſpinis & limbus argenteis, M. 13.

A. 3. II b. 15. Fol. ſubrotundus, limbus argenteis ſpinulis & marginalibus purpuraſcentibus, M. 14.

b. 16. Fol. longioribus, limbus & ſpinus, ex unicotam, later pertotum argenteo pictis, M. 10.

b. 17. Fol. oblongus, ſpinus & limbus flaveſcentibus, M. 15.

a. 18. Fol. lato ſpinis & limbus albicantibus.

b. 19. Fol. parvis, interdum vix ſpinoſa limbus & ſpinis argenteis.

a. 20. . . oblongis ſpinis & limbis luteis, M. 17.

b. 21. . . ſubrotundo ſpinis minoribus, fol. ex luteis, Elegantiſſimo varieg. M. 18.

b. 22. . . latioribus ſpinis & limbis flaveſcentibus, M. 20.

b. 23. . . oblongis, ſpinis & limbis ocroluteis, M. 30.

b. 24. . . . . ex luteo & aureo Eleg. varieg. M. 27.

b. 25. . . . . . ſpinis majoribus fol. ex aur. var. M. 21.

Habitus	Cultuure	
A. 3. ♊	b.	26. Fol. oblongis lucidis ſpinis & limbis arg. M. 12.
	b.	27. . . ex luteis Eleg. var. baccis aureis.
	b.	28. . . ſubrotundis ſpinis & limbis aureis, M. 22.
	b.	29. . . anguſtiori ſpinis & limbis flaveſcentibus.
	b.	30. . . oblongis lucidis ſpinis & limbis aureis, M. 16
	a.	31. . . Echinata, ſuperficie, fol. ex luteis Varieg. M. 7.

AQUILEGIA, Fr. *Ancholie*, Eng. *Columbine*.

P. 2. ♊ †	a.	1. Fl. pleno purpureo, B. 8.
P. 2. ♊ †	a.	2. . . . varieg. B. 11.
P. 2. ♊ †	a.	3. . . . ſtellato varieg.
P. 2. ♊ †	a.	4. . . . Rubento ferrugineo.
P. 2. ♊ †	a.	5. . . . intenſiore Cæruleo.
P. 2. ♊ †	a.	6. . . . ſtellato rubello.

ARALIA, Eng. *Berry-bearing*.

A. 3.	b.	1. Caule foliolisque æculeata L. 1.
P. 2. ♋	a.	2. Canadenſis racemoſa L. 3.
A. 3.	a.	3. Folio lanceolato, *arrow wood dicta*.

ARBOR JUDÆ, Fr. *Guainier*, Eng. *Judas-tree*.

A. 3. ♉ †	a.	1. Fol. Cordato orbiculatis glabris, *Cercis L.* 1.
A. 3. ♉ †	a.	2. Canadenſis.
A. 3. ♉ †	a.	3. Caroliniensis floribus parvis.

ARBOR TULIPIFERA, Fr. *Tulipier*, Eng. *Tulip tree*.

A. 2. ♌ †	a.	1. Virginiana, Liriodendron, L. & R.

ARBUTUS, Fr. *Arbouſier*, Eng. *Strawberry tree*.

A. 3. ♒ †	b.	1. Fol. latiori ſerrato, fructiferens, L. 1.
A. 3. ♒ †	b.	2. . . . . . fl. duplici M. 3.
A. 3. ♒ †	b.	3. . . anguſtiori fl. rubro.

Arctotis v. Anemonospermos.

ARI-

Habitus	Cultuure	
		ARISTOLOCHIA, Eng. *Birth-wort.*
P. 3. ♊	a.	1. Caule Erecto L. 13.
P. 1. ♊ ♍ †	b.	2. . . infirmi fl. ex purpura nigro L. 11.
F. ♋ †	b.	3. Smilace fol. floribus recurvus L. 8.
F ♋ ♏ †	c.	4. Caule erecto fol. Cordato fl. purpureo L. 12.
		ARTEMISIA, Fr. *Armoise*, Eng. *Meigwort.* adde Absinthium
P. 2. ♍	a.	1. Fol. ex argenteis varieg. B. 3.
F. ♍	b.	2. . . lanceolatis subtus. tomentosis, L. 14.
F. ♍	d.	3. Afr. fol. bipinnatis, ad L. 11.
		ARUM, Fr. *Pied de veau*, Eng. *Wake-robin*
P. 2. ♈ †	d.*	1. Ægyptiacum vulgo; B. 6. *Calla* L. 1.
P. 1. ♈ †	d.*	2. Afr. fl. albo vix odoratis minus, B. 7.
B. 2. ♊ †	a.	3. Fol. palmatis Caule maculato, R & L. 1.
B. 1. ♋	a.	4. . . . . . non maculato, R & L. 2.
P. 1.	e. *o. s.*	5. . . peltatis ovatis, R. 3. L. 6.
P. 2.	e. *o. s.*	6. . . cordatis obtusis cum acumine, R. 6. L. 8.
P. 1.	e. *o. s.*	7. Acaule fol. sagittatis, pediculis & foliorum atropuniceis, R. 9. L. 11.
P. 1.	e. *o. s.*	8. Zeylanica minus pediculis punicantibus, B. 4.
P. 2. ♈ †	d.*	9. Ut No. 1. fol. variegato.
V. ↔	f. *o. s.*	10. Hederaceum fol. perfoliatis, *dracontium*, L. 5.
R. ♊	a.	11. Vulgare maculato, R. 10. L. 12. *B.*
R. ♊	a.	12. Palustris radice arundinaceo, B. 5. Calla, R. 1 L. 2.
P. 1.	e. *o. s.*	13. Acaule folio sagittatis triangulis, R. 9.
		ARUNCUS.
P. 4. ♋	a.	1. Fol. supra decompositis, *Spiræa* L. 8.
		ARGYRODENDRON, Eng. *Silver-tree.*
A. 3.	d.	1. Seu Conocarpodendron fol. argenteis sericeis latissimis, *Protea* L. 1.

Habitus	Cultuure	

ARUNDO, Fr. *Roseau*, Eng. *Reed.*

P. 3.	f. o.	1. Sacharifera B. 4. *Saccharum L.* 1.
P. 6.	c.	2. Indica Variegato, B. 3. L. 2. β.
P. 10.	a.	3. Sativa, *donax dicta* L. 2.
P. 3.	f. o.	4. Orientalis.

ASARUM, Fr. *Cabaret*, Eng. *Asarrabacca.*

P. ½. ♈	a.	1. Fol. subcordatis L. 1.

v. Apocynum

ASCLEPIAS, Fr. *Dompte Venin*, Eng. *Swallouw-wort.*

P. ½. ♌ †	e. o. *f.*	1. Azoides afr. B. 4. M. 4. *stapelia R & L.* 1.
P. ½.	e. o. *f.*	2. . . . fol. Compresso digitato & Cristato, B. 6 M. 6.
P. 1. ♌ †	e. o. *f.*	3. . . . fl. pulchro fimbriato, B. 5. M. 5. *stapelia R & L.* 2.
P. 1.	e. o. *f.*	4. . . . ramorum erectis denticulis magnis.
V. ♋ ♍ †	a.	5. Caule volubili nigro flore, L. 13.
P. 3. ♋	a.	6. . . erecto fl. albo, L. 12.
P. 3. ♋	a.	7. . . . . flavescente, B. 2.

ASCYRUM, Eng. *St. peters Wort.*

F. ♂ †	d.	1. Balearicum frutes: maxim. fl. luteo, B. 2. *hypericum*, *R & L.* 1.
P. 1. ♊ †	a.	2. Magno flore, B. 1. *hypericum*, *R.* 2. *L.* 4.

ASPARAGUS.

V. ♌	c.	1. Afr. schandens Myrti fol. R. 7. *Medeola*, *L* 3.
P. 3.	c.	2. . . tenui folio vimenalibus virgis, R. 3. L. 4.
P. 1.	d.	3. . . aculeatis minor, B. 7.
P. 2.	c.	4. Hispan. aculeis Crassioribus horridis, T.
P. 2.	d.	5. Afr. aculeatis fol. linearibus lucidis spinis reflexis.
P. 1.	d.	6. . . inermis ramis declinatis, B. 6. L. 2.

Habitus	Cultuure	
		ASPERULA, Eng. *Wood-roof.*
P. 2. ♊ †	a.	1. Fol. quaternis ovato-lanceolatis, R & L. 3.
P. 2. ♊	a.	2. Odorata fl. albo, R. 2. L. 1.
		ASPHODELUS, Fr. *Asfodele*, Eng. *Kingspear.*
P. 2. ♋ †	a.	1. Luteo flore & radice, R & L. 1.
P. 1. ♋ †	a.	2. Alobrogicus magno fl lilii, *Hemorocallis, R & L.* 2.
P. 2. ♋. †	a.	3. Albis non ramosis, B. 3.
		4
		ASPLENIUM, Fr. *Ceterac*, Eng. *Spleenwort.* adde Lingua Cervina.
P. ½. ♋	b.	1. Sive Ceterach, R & L. 7.
		ASTER, Eng. *Star-wort.*
P. 6 ♌	a.	1. Om. maximum helenium dictum R. 1. *inula L.* 1.
F. ♉ †	d.	2. Afr. fruticosa, fol. angustis fl. Cæruleo, R. 10. L. 1.
F. δ †	d.	3. . . . . . . oblongo rotundo, rugoso, fl. Elegantissimo Cœruleo *othonna fl. Cœruleo.*
P. 2. ♍ †	a.	4. Atticus Cœrulus vulgaris, R. 15. L. 5.
P. 3. ♍	a.	5. Amer. latis & Crenatis fol. R. 9.
P. 3. ♍ †	b.	6. Tripoli flore, angustiss. fol. R. 8. L. 10.
P. 2. ♍ †	a.	7. Canadensis fol. imis ampliori Cordato, M. 26.
P. 5. ♎ †	a.	8. Virg. serrotinus parvo albente flore, R. 7. L. 24.
P. 4. ♎ †	a.	9. Nova angliæ virga aurea facie fl. Cœruleo.
P. ½. δ †	d.	10. Afr. humillima fol. linearib. fl. Cœruleo. semper florescente.
F. ♌ †	d.	11. Afr. fruticosa fol. linearibus Cinereis flore amplo Cœruleo.
P. 2. ♍	a.	12. Humilis fol. linearibus, fl. pallide Cœruleo.
		ASTEROIDES, Eng. *Yellow starwort.*
P. 1. ♋ ♏ †	a.	1. Alpina Salice folio B. *buphthalmum, R. 5. L. 5.*
P. ½. δ †	c.	2. Maritimus perennis B. 7. *buphthalmum, R. 3. L.* 5.

4. Asphodelus f. planis, caule ramoso 3. Vit. fl. sparsis (albis. Cap. B. 5.) Mill. 56.

Habitus	Cultuure	
P. ½. ♌ †	a.	3. Virginianus amplo flore.
F. ♓ †	c.	4. Frutescens leucoi fol. sericeis, *bupthalmum*, *R 6. L. 1.*

ASTRAGALUS, Fr. *Astragale*, Eng. *Milk vetch.*

P. 3. ♋ †	a.	1. Alpina, alopecuroides, R. & L. 1.
P. 3. ♋ †	a.	2. Orient. fol. galega, B. 3. T.
P. 4. ♋	a.	3. Leguminis subglobosis, B. 3. siliqua Curta, R. 12. L. 11.

ASTRANTIA, Eng. *Master wort.*

P. 2. ♋.	a.	1. Major floris candidis, B. 2. R & L. 1.

ATAMANTHA, Eng. *Spignel.*

P. 2. ♋	a.	1. Fol. Capillaribus, R. 1. L. 5.
P. 2. ♋	a.	2. . . multifidis planis, R. 3. L. 4.

ATRACTYLIS, Eng. *Distaff thistle.*

F. ♉ †	c.	1. Fol. oblongo ovato, R. 2. L. 1.

A T R A P H A X I S.

F. ♍	d.	1. Inermis, L. 2.

ATROPHA, Eng. *Deadly nightshade.*

P. 2. ♌	a.	1. Caule herbaceo L. 1. *belladona*, *solanum furiosum vulgo.*
P. 2. ♌ ♏ †	b.	2. . . . fruticoso, L. 3.

ATRIPLEX, Fr. *Pourpier de mer*, Eng. *Orrach.*

A. 4. ♎	b.	1. Latifolio fruticoso, R. 5. L. 4.
F. ♎	a.	2. Angusti folio fruticoso, L. 2.
F. ♎	c.	3. Fruticoso fol. arcuatis acutis sessilibus.

AZALEA, Eng. *American honeysuckle.*

F. ♋ †	b.	1. Flore rubro.

AZE-

Habitus Cultuure

AZEDARACH, Eng. *Bead-tree.*

A. 3. ♍ † b. 1. Major fl. Cœruleo, B. 1. *melia*, R. 2. L. 1.
A. 4. ♌ ♎ † c. 2. Minor fl. Cœruleo odorato, *melia*, L. 1. β.

AURANTIUM, Fr. *Oranger*, Eng. *Orange tree.*

d. 1. Anglium dictum fol. ex albo varieg.
c. 2. . . . . dictum fol. ex aureo varieg.
c. 3. Chinensis medulla dulci, *Olysiponensis Ferrari.*
d. 4. . . . . medullæ dulci, cortice tenui.
c. 5. . . . . medullæ acri.
c. 6. Corniculatum, Ferrari.
d. 7. . . . . . fol. Eleg. ex aureo varieg.
c. 8. Curasavica vera.
c. 9. Folio Cripso, Ferrari.
d. 10. . . . Cripso, Elegantet variegato.
c. 11. . . . Cripso acuto fr. maxim. per maturæ viridi
c. 12. . . . & fructo varieg. *Virgatum Ferrari.*
d. 13. . . . & fructu ex aureo Eleg. varieg.
c. 14. Flores & fructu quasi umbellatæ.
c. 15. Fl. plene fructu dupresso, *flores duplici Ferrari.*
c. 16. Fl. rubro fruct atro viridis.
A. 2. ♌ † c. 17. Fructu amaro.
c. 18. . . . dulce.
c. 19. . . . dupresso, *Bergamotbi vulgo.*
c. 20. . . . facie Limonis.
c. 21. . . . facie Limonis altera sorte.
c. 22. . . . oblongo glabro.
c. 23. . . . querci effigui.
c. 24. . . . incanellatum vel melonato, *striatum Ferrari.*
c. 25. Indiæ occidentalis, *Pompelmoes fol. non Serrato.*
c. 26. . . . occidentalis, Crispo folio.
c. 27. . . . occident. Crispo fol. per intervallæ variegato.
c. 28. . . . occid. Crispo fol. quasi incanis.
c. 29. . . . occid fol. valde Lobatis.
c. 30. . . . occid. fructu carno rubro.
c. 31. . . . orient. fol. Crispo fructu odoratissimo.
c. 32. . . . orient. fol. Crispo per intervalle variegato.

Habitus	Cultuure	
	c.	33. Indicus max. *pompelmoes folio serrato, aurantium max. ferrari.*
A.2.Ω†	c.	34. . . . max. surinamensis.
	d.	35. Hermaphroditum fructu partim aurantii partim citrii, *Bisarre vulgo Aurant. Callosum Ferrari.*
	d.	36. Humilis Chinensis, *vulgo nana, aur. sinensis Ferrari.*
F.Ω†	d.	37. . . . Chinensis fol. ex albo Eleg. varieg.
	d.	38. . . . . Chinensis fol. ex Luteo variegato.
	c.	39. Salicis angusti folio fructi dulce.
	c.	40. . . . ang. fol. varieg. fructu dulce striato.
	c.	41. . . . Late folio.
	c.	42. . . . late fol. variegato.
	c.	43. Schorsa grossa
A.2.Ω†	c.	44. . . . grossa fol. acutis.
	c.	45. Angliæ dicta.
	c.	46. Fructu Costato verrucoso.
	c.	47. Salice fol. altera.
	d.	48. Americana, fol. myrti ampliori, *pompadoure dicta.*
	c.	49. Calabriæ fructu Limoni.

LIMON, Fr. *Limonier*, Eng. *Lemon-tree.*

Habitus	Cultuure	
	c.	1. Angustissimo folio.
	d.	2. Aguezo apetito.
	c.	3. Augusto Rola di Portugal dulce.
	d.	4. Barbarino longo, *Pseudocitratus barbarinorum Ferrari.*
	c.	5. Bergamotte bisarreo.
	c.	6. . . . . . delle grande sorte.
	c.	7. . . . . ordinario consoglia Liscia.
	c.	8. Bianco del ferrario.
A.2.Ω†	c.	9. Bisantinum.
	d.	10. Bisarreo fol. Elegantiss. varieg.
	d.	11. Citrato giaretto.
	d.	12. De Chios.
	c.	13. De gaëta, *Cajetanus Ferrari.*
	d.	14. . . . . foliis variegatis.
	d.	15. De Surinaam.
	d.	16. Del Cabo du bona esperance.
	c.	17. Della grande sorte di Lago st. Garda.

Habitus	Cultuure	
	d.	18. Della Gianda fructu dulce, coronato, *aker Limoen.*
	c.	19. d'Hollande.
	d.	20. Di curacao.
	d.	21. . . . . . grande.
	c.	22. Di Geneve.
	c.	23. Di Portugal.
	c.	24. . . . . . . grande.
	c.	25. Di Roma.
	c.	26. Di ſt. Remo oblonga Coſta minori.
	c.	27. Digitato, *katte klaauw vulgo.*
	d.	28. Ex biſarreo degener.
	c.	29. Fol. duro Cordato.
	d.	30. . . . Criſpo fructu Cucumerino.
	c.	31. . . . ex Luteo variegato, *Amſtelveenſe bonte.*
	c.	32. Fructu albo magno.
	c.	33. . . . . aureo Coloris, *Goud limoen vulgo.*
	d.	34. . . . . Cucumerino.
	c.	35. . . . . dulce, *dulci medulla Vulgaris Ferrari.*
	d.	36. . . . . dulce fol. variegato.
	d.	37. . . . . incanellato, *ſtriatus Vulgatior Ferrari.*
A. 2. Ω †	d.	38. . . . . incanellato, altera ſorte.
	c.	39. Incognita.
	c.	40. . . . . . altera ſorte.
	c.	41. Monſtroſa.
	c.	42. Pomum adami communi Ferrari *zwarte Limoen.*
	c.	43. . . . . adami altera ſorte.
	d.	44. . . . . adami Citrato.
	d.	45. . . . . adami fœtiferum, *alteram includens Ferrari.*
	d.	46. Ponſino rubens, ferrari.
	c.	47. Sainct remi, ferrari.
	c.	48. Salerno.
	c.	49. Sbardonius, ferrari.
	c.	50. Vulgaris, ferrari.
	c.	51. Fol. acutiſſimo.
	c.	52. Digitato altera forte.
	d.	53. Fol. ex aureis luteis & viridis varieg.
	d.	54. . . . petiolatis.
	c.	55. Grande.
	c.	56. Occidentalis.
	c.	57. Acuminatis.
	c.	58. Di napoli.

Habitus	Cultuure	
	c.	59. Cedrato.
	c.	60. Forte Costato.
A.2.♌†	c.	61. Imperiali.
	c.	62. Fol. oblongo.
	c.	63. . . . rotundiori.

L I M O N E T.

	d.	1. Amer. fr. parva dulce.
	d.	2. Calabria major. } *Limon pucillis Calabrie Ferrari.*
	d.	3. . . . . . minor.
	d.	4. . . . . . di napoli.
	c.	5. Ex horto domini de Maraiz.
	c.	6. Foliis undulatis.
	d.	7. Fructu amaro, *Lima acris Ferrari.*
	d.	8. . . . . dulce, *Lima dulcis Ferrari.*
	c.	9. Ou Lumia a pyretto con foglia Liscia.
A.3.♌†	d.	10. Ou Lumia a Zuchetta.
	d.	11. Ou Lumia d'Hollande di fiore doppio.
	c.	12. Ou Lumia racemosa, *Limon racemosa ferrari.*
	d.	13. Salicis fol. *Lima fl. pleno vel salia.*
	d.	14. Cerasi folio.
	d.	15. Vel limia olesipponensis.
	d.	16. . . . . . regia minima
	d.	17. . . . . . parva de St dominique.
	d.	18. . . . . . da ragusina.
	d.	19. . . . . . imperiali.

C E D R O, Fr. *Citroenier.*

	d.	1. Apyretto.
	d.	2. Acuminato di St. Remo.
	c.	3. Bergamotti.
	c.	4. Del Zanten.
	d.	5. Gaëtani.
	c.	6. Grande Liscio bondolotto.
	c.	7. Incognita.
A.2.♌†	c.	8. . . . . . altera forte.
	c.	9. Judaïca.
	d.	10. Ordinario col pigolo.
	c.	11. Vulgaris, *citreum Vulgaris Ferrari.*
	d.	12. Fol. ex albicante maculato, velpunctato.
	c.	13. Magno fol. mucronato.
	d.	14 Non spinoso fructu longo.
	c.	15 Longo.

Habitus	Cultuure	
A. 2. ♌ †	d.	16. Fructu Minore.
	c.	17. d'Hollande.
	c.	18. Verrucoſo.
	d.	19. Grande verrucoſo de guadix.
	d.	20. Monſtroſo.
	c.	21. Di grande rive.
P. ½. ♉ †	a.	AURICULA URSI, Fr. *Orielle d'ours*, Eng. *Bear's ear.* Dont on, trouve ci aprez un denombrement des plus beaux Eſpeces en toute ſortes des Couleurs & ouvrages.

BACHARIS, Eng. *Plowman's ſpikenard.*

F. ♌	c.	1. Fol. dentato ſerrato, L. 1.
F. ♎	c.	2. . . obverſe ovatis, L. 4.
A. 3. ♍	c.	3. . . lanceolatis, L. 3.

BARBAJOVIS, Eng. *Jupiters beard.*

A. 4. ♌	c.	1. Pulchre Lucens, M. 1. *anthyllis*, L. 6.
F. ♅ †	d.	2. Fol. pinnatis fl. Cæruleo, M. 4 *pſoralea*, *L.* 1.
F. ♎ †	a.	3. Caroliniensis pſeudoacacia fol. M. 3. *amorpha*, *L.*

B A R L E R I A.

F.	e. o.	1. Spinis laterialibus, R. L. 2 *coletta veetla.*
F. ♍ †	d.	2. Fol. ſubrotundis, L. 3. *fl. albo odorato.*
F. ♍	f. o.	3. . . lanceolatis fl. albo.

BASELLA, Eng. *Climbing nigchtſhade.*

V. ♌	e. o.	1. Fol. planis, Caule paleſcente, L. 1. M. 2.
V. ♌	e. o.	2. . . . . purpuraſcente, L & M. 1.

× BAUHINIA, Eng. *Montain ebony.*

F. ♍ †	f. o. x.	1. Non aculeato fol. bicornis, L. 3.
F. ♍ †	f. o. x.	2. . . . . . . profundiore incisis, H. C. tab. 15.

BASTERIA (Allspice angl.) Mill. t 60.
Calycanthus floridus. L.

Habitus Cultuure

BENZOIN, Eng. *Benjamin tree.*

A.4. ♉ b. 1. Officinarim, B. *Laurus*, *L* 9.

BERBERIS, Fr. *Epine-vinete*, Eng. *Berberey.*

A.3. ♊ † a. 1. dumetorum, L. 1.

BERMUDIANA.

P.½. ♂ † a. 1. Iridis folio, L. 1. β. Sisyrinchium L.

P.1. ♎ f.o. 2. Palmæ fol. radice phœniceo fl. albo, B & M. 2.

BETONICA, Fr. *Betoine*, Eng. *Betony.*

P.1. ♊ † a. 1. Orient. Spica florum Craſſioris L. 2.

P.1. ♊ a. 2. Purpureo L. 1. α.

P.1. ♊ a. 3. . . . . fol. Eleg. Varieg.

BETULA, Fr. *Bouleau*, Eng. *Birch-tree.*

A.3. a. 1. Nigra Virginiana L. 2.

A.3. a. 2. Fol. Cordatis oblongo, acuminatis ſerratis, L. 3.

BIGNONIA, Fr. *Jasmin d'Americque*, Eng. *Trumpet flower.*

A.3. ♍ a. 1. Fol. Simplici Cordato, L. 1. *Catalpa dicta.*

V. ♎ † a. 2. Amer. fraxini fol. fl. amplo Phæniceo L. 10. α.

V. ♎ † a. 3. . . . ſchandens fol. pinnatis foliolis denticulatis.

V. ♎ † a. 4. Carolini fraxini fol. fl. coccineo minore L. 10. β.

V. ♎ † a. 5. Bifolia ſchandens, L. 4.

V. ♎ † a. 6. Amer. ſchandens tetraphylla & pentaphylla M. 10.

V. ♎ † a. 7. Caroliniensis ſchandens floribus luteis odoratis M. 11.

BISTORTA, Eng. *Snake weed.*

P.1. ♂ † a. 1. Maſor radice intorta R. 1. *polygonum L.* 2.

P.½. ♂ † a. 2. Alpina Sobolifera B. 3. *polygonum L.* 3.

PIXA,

Habitus Culture

BIXA, Fr. *Rouco*, Eng. *Arnotte*.

A. 4. g. o. x. 1. Americana R & L.

BLATTARIA, Fr. *Herbe aux mites*, Eng. *Moth mullein*.

P. 3. ♋ † a. 1. Perennis fl. obsoleto fusco apice pistilla purp. B. 2. M. 8. *Verbascum L.* 3.

P. 2. ♋ † a. 2. . . . fl. amplo purp. B 5. Verbascum R. 6. L. 5.

P. 2. ♋ † a. 3. . . . degener, fl. amplo pallide purpureo.

BONDUC, Eng. *Nickar tree*.

A. 3. f. o. x. 1. Majus polyphyllum B. guilandina L. 1.

BONTIA, Eng *Wild olive*.

F. f. 1. Laureola facie L.

BORRAGO, Fr. *Bourache*.

P. 1. ♈ † b. 1. Constant. fl. reflexo R. & L. 4.

BOSEA, Eng. *Golden-rod tree*.

A. 4. ♌ c. 1. Racemosa, yerva mora dicta L.

BRYONIA, Fr. *Coleuvrée*. *BRUNSFELSIA v. Jasmin 12*

R. V. ♌ c. 1. Afr. lacineata fol. tuberosa radice R. 3. L. 5.

V. c. s. 2. Curassavica fol. dentata Crasso B. 7. *Sicyos* L. 3. *BUBON v. Apium 1. v. Ferula.*

BUGULA, Fr. *Bugle*.

P. 1. ♉ † b. 1. Orient villosis fl. purp. B. 6. M. 8. *ajuga* L. 1. β.

BULBINE, Eng. *Spiderwort*.

F. ♉ † c. s. 1. Caulescens floribus aureis R. 1. *anthericum L.* 4.

P. $\frac{1}{2}$. ♉ † c. s. 2. Acaulus fol. subulatis R. 3. *anthericum L.* 6.

P. $\frac{1}{2}$. ♉ † c. s. 3. . . . Lanceolatis R. 2. anthericum L. 5.

P. $\frac{1}{2}$. ♉ † c. s. 4. . . . Cetaceis Caule angustiore R. 4.

P. 1. ♉ † c. s. 5. . . . Cæpæ succulentis, floribus spicato amplo aureo.

BROMELIA v. ... v. Ananas.

Habitus Cultuure

BUPTHALMUM, Fr. *Oeil de beuf*, Eng. *Ox eye.*

P. 2. ♂ † a. 1. Orient. tanacet. fol. fl. aureo amplissimo R. 9. *anthemis* L. 16.

P. 2. ♂ † a. 2. Eadem fl. Sulphures.

P. 2. ♂ † a. 3. Alpinum fl. Candido, *anthemis* L. 16. β.

F. d. 4. Virginian. fruticosum Leucoi viridi folio.

BULBOCASTANUM, Fr. *Terre noix*, Eng. *Earth nut.*

R. 2. ♃ a. 1. Majus fol. apii, B. 1. M. 1. *Bunium* R & L. 1.

BULBOCODIUM, Colchicum Vernum.

B. ½. ♈ a. 1. Fol. lanceolatis R. 1. L. 1.

BUPLEURUM, Eng. *Hare s'ear.*

A. 3. ♍ c. 1. Arbor salice folio, R. 1. L. 12.

F. ♍ d. 2. Fol. linearibus, vel radicalibus pinnato R. 5. L. 13.

BUPLEUROIDES.

F. ♋ c. 1. Quæ simpla nobla, *Phyllus R. & L.* 1.

BUXUS, Fr. *Buis*, Eng. *Box tree.*

F. ♉ a. 1. Arboreus fol. ex aureis Varieg. B. 3. M. 3.

F. ♉ a. 2. . . . . . . argenteis Varieg.

F. ♉ b. 3. . . . humilus fol. Eleg. Varieg. B. 16. M. 6.

CAINITO.

A. 3. f. *o. x.* 1. Fol. lanceolatis Splendentibus *Chrysophyllum L.*

CALAMINTHA, Fr. *Calament.*

P. 1. ♂ † a. 1. Montana longitudini florum B. 6. *melissa L.* 2.

P. ½. ♋ d. 2. Hispanica marii folio, B. 5. *melissa R.* 4. *L.* 6.

P. 1. ♋ a. 3. Montana Officinarum. *melissa R.* 2. *L.* 3.

CALCEOLUS Mariana, Fr. *Sabot*, Eng. *Ladies slipper.*

P. ½. b. 1. Fol. ovato Lanceolato, T. *cypripedeum L.* 1. α.

CA-

Habitus	Cultuure	
		CALENDULA, Eng. *African Marigold.*
P. $\frac{1}{2}$. δ †	d.	1. Afr. fol. linearibus, R. 4. L. 5. *caltha afr. croci folio* B. 12.
F. ♌ †	d.	2. . . Caule fruticoso R. 5. pag. 531. M. 4.
		CALLICARPA.
A. 4.	d.	1. Fol. molli & incano L. 1.
		CALTHOIDES.
F. ♌	b.	1. Fruticosis afr. Luteis, *othonna* L. 13. β.
		CAMPANULA, Fr. *Campanule*, Eng. *Bell flower.*
P. 3. ♓ †	e.	1. Canariensis atriplici folio, L. 25. H. C. tab. 83
P. 2. ♋ †	a.	2. Persicæ fol. fl. albo pleno B. & M. 5. } L. 7.
P. 2. ♋ †	a.	3. . . . . . Cæruleo pleno B. 3. M. 5. } L. 7.
P. 2. ♋ †	a.	4. Urtice fol. fl. duplici albo B. 23. M. 10. } L. 18.
P. 2. ♋ †	a.	5. . . . . . . pallido. } L. 18.
P. 2. ♋ †	a.	6. . . . . . . cæruleo B. 21. M. 9. } L. 18.
P. 3. ♋ †	a.	7. Maxima fl. albo fere digitali, R. 4. L. 13.
P. 1. ♋	a.	8. Humilus fol. Cordato fl. oblongo Cœruleo.
P. 1. ♋ †	a.	9 Minor Lineari fol. fl. albo, B. 11. L. 3. œ.
P. 1. ♋ †	a.	10. . . . . . . Cæruleo B. 10. L. 3. β.
P. $\frac{1}{2}$. ♋ †	a.	11. Amer. minor fol. rigidis fl. albo.
P. $\frac{1}{2}$. ♋ †	a.	12. . . . . cæruleo, R. 8. L. 9.
P. 3. ♋ †	b.	13. Maxima Lobeli, R. 6. L. 8.
P. 2. ♋ †	a.	14. Rapunculus dicta. L. 5.
P. 3. ♋ †	b.	15. Maxima Lobeli fol. variegatis.
		CAMPHORATA.
F. δ †	d.	1. Fl. albo umbellato, *selago*, R & L. 1.
		CAMPHORIFERA, Eng. *Camphire tree.*
A. 2.	c.	1. Officinarum B. *Laurus*, L. 3.

CALLA v. Arum l. 12

CALTHA v. Populago

E CAM-

Habitus Cultuure

Caña v. CANNA-CORUS, Fr. *Ballisier*, Eng. *Indian flowrigreed.*

P. 2. ♌ † e. *x*. 1. Ampliore flore, iridis palustre facie, *Canna R.* 2. *L.* 3.
P. 2. ♌ † e. *ſ*. 2. Amplissimo folio fl. rutilo, M. 5.
P. 2. ♌ e *ſ*. 3. Latifolia fl. luteo, R & L. 1. M. 1.
P. 2. ♌ e. *ſ*. 4. . . . . Eleg. variegeto, M. 2.
P. 2. ♌ † e. *ſ*. *x*. 5. . . . . . fl. Coccineo splendento, M. 4.

CAMELLIA v. Laurus

CAPPARIS, Fr. *Caprier*, Eng. *Caper-bush.*

F. ♍ † d. 1. Spinosa fol. rotundo, R & L. 1.

CAPRARIA, Eng. *Sweet weed.*

F. ♁ f. 1. Fol. alternis, L. 1. M. 1.
F. ♁ f. 2. . . . ternis, M. 2.

CAPRIFOLIUM, Fr. *Chevre feuille*, Eng. *Honeysuckle.*

V. ♌ † a. 1. Persoliatum semper virens floribus speciosibus, M. 10.
V. ♌ a. 2. Non perfoliatum fol. ex luteo varieg. M. 5.
V. ♋ † a. 3. Perfoliatum fl. albo præcox, M. 7. *lonicera*, *L.* 1.
V. ♌ † a. 4. Non perfoliatum fl. externe rubento, M. 2. *lonicera*, L. 3.
V. ♌ † a. 5. . . . . . . albicante.
V. ♌ a. 6. . . . . . foliis sinuosis, M. 3.
V. ♌ a. 7. . . . . & variegatis, M. 4.

CAPSICUM, Fr. *poivre d'inde*, Eng. *Barbary or bird pepper.*

F. ♌ e. 1. Caule fruticose fructu parva erecto rubro, L. 2. M. 14.
F. ♌ e. 2. . . . . . . aureo rotundo, M. 15.

CARAGANA.

A. 3. a. 1. Sibirica R. pag. 737. *Robinia*, *L.* 3. M. 3.

CAR-

Habitus Cultuure

CARDAMINE, Eng. *Ladies Smock.*

P. $\frac{1}{2}$. ♊ † a. 1. Magno fl. pleno, M. 3.

CARDUUS, Fr. *Chardon*, Eng. *Thistle.*

P. 3. ♌ † a. 1. Fol. & facie atractylus, R. 7. L. 11.
P. 3. ♌ † a. 2. Capite rotundo tomentoso, *B. 11. chardon Musque.*
P. 4. ♌ a. 3. Capite nutante, L. 4.
P. 5. ♌ † a. 4. Mollis Circæa facie fl. rubro quæsi umbellato.

C A R E X.

P. 1. ♌ a. 1. Africana, fol. triangularis spica globosa.

CARICA, Eng. *Papaw-tree.*

A. 2. f. *o. x.* 1. Fructu melopeponi, L. 1.

CARLINA, Eng. *Carline thistle.*

P. $\frac{1}{2}$. ♋ † a. 1. Acaulos fol. amplis tomentosis fl. albo magno, L. 6.
P. $\frac{1}{2}$. ♋ † a. 2. . . . . . pinnatis fl. amplo argenteo.

CARPINUS, Fr. *Charme*, Eng. *Horn-beam.*

A. 2. a. 1. Virginianis florescens. M. 4.
A. 4. a. 2. Fol. ex luteo variegato, M. 2. L. 2. *β.*

CARYOPHYLATA, Fr. *Benoîte*, Eng. *Avens.*

P. $\frac{1}{2}$. ♉ † a. 1. Alpina fl. amplo aureo, *geum L.* 4. æ.
P. 1. ƺ a. 2. Floribus erectis, *geum L.* 2.
P. 1. ƺ a. 3. . . . nutantibus, *geum L.* 3.

CARYOPHYLUS, PLUMARIUS, Eng. *Pinks.*

P. $\frac{1}{2}$. ♋ † a. 1. Tenui fol. fl. pleno amplo albo, fundo purpurascente.
P. $\frac{1}{2}$. ♋ † a. 2. . . . . rubro *dianthus*, *L.* 9.
P. $\frac{1}{2}$. ♋ a. 3. . . . . . . tenuissimo dissecto.

Habitus	Cultuure	
		CARYOPHYLUS BARBATUS, Eng. *Sweet-John.*
P. 1. ♋	a.	1. Flore pleno Eleg. varieg. dianthus, L. 92.
		CARYOPHYLUS CHINENSIS, Fr. *Oeillets de Chine.*
P. 1. ♋ †	b.	1. Latifolio fl. pleno. } *dianthus*, L. 8.
P. 1. ♋ †	b.	2. Angusti fol. fl. plenno. } *dianthus*, L. 8.
P. ½. ♋ †	a.	3. Floribus solitarius fl. parvo rubro varieg.
P. 1. ♋	a.	4. Prolifera *dianthus*, L. 4.
P. 2. ♌ †	a & b.	CARYOPHYLUS HORTENSIS, Fr. *Oeillets*, Eng. *Carnation.* Dont on trouve ci aprez adjoint, un denombrement des plus beaux especes qui sont connue jusq'ici en Hollande.
		CASSIA, Fr. *Casse.*
F.	e.	1. Foliolis triumparium, L. 5.
F.	f. *o x.*	2. Fistula alexandrina, L. 12.
P. 3. ♍ †	b.	3. . . . quinque vel sexjugatis, occidentalis.
F. ♎ †	f. *o. x.*	4. . . . quatuor vel quinque jugatis, L. 10.
F. ♎ †	f. *o. x.*	5. . . . quinque parium acutis lanceolatis.
P. 3. ♍ †	b.	6. Occidentalis, vel senna occident, vulgaris.
		CASSINE, Eng. *Southsea*, *thea.*
A. 4.	c.	1. Vera floridanorum alterni fermc facie, M. 2. *ilex*, *L.* 2. *β.*
A. 4. ♍	d.	2. Capensis, R. 1. & L. 1. *lepelbont vulgo.*
A. 4. ♎ †	b.	3. Fol. acutioribus fl. albo umbellato, *vulgo Thee boom.*
A. 4. ♎	c.	4. Fol. rotundioribus fl. albo umbellato, M. 1.
		CASTANEA SATIVA, Fr. *Chateigner*, Eng. *Chestnut.*
A. 3. ♋	a.	1. Fol. ex aures Eleg. varieg. M. 2. *Fagus*, *L.*
A. 4.	a.	2. Virg. pumila racemoso fructu parvo, M. 4. *Fagus*, *L.* 2.

Habitus	Cultuure	
		CASTANEA ÆQUINA, Fr. *Maronnier d'inde*, Eng. *Horse Chestnut.*
A. 2. ♊ †	a.	1. Fol. ex luteo varieg. M. 2. } æsculus L.
A. 2. ♊ †	a.	2. . . . albo varieg. M. 3. }
		CATANANCE, Eng. *Lions foot.*
P. 1. ☿ †	b.	1. Quorundam fl. Cæruleo, L. 1. *plantæ perenni.*
		CEANOTHUS, Eng. *Staff tree.*
F.	f.	1. Fol. ovatis enerviis, L. 2.
F. ♍ ♑ †	a.	2. . . trinerviis, L. 1. *Celastris inermis*, M. 1.
		CEDRUS, Fr. *Cédre.*
A. 3. ♉	c.	1. Ex goa fol. Cypreſſi, B. *Juniperis*, *R.* 5. *L.* 4.
A. 3.	b.	2. Virginiana rubra.
A. 3.	b.	3. . . . alba.
		CELASTRIS. adde Alaternoides. 3.
A. 4. ♍ †	d.	1. Afr. fructi triloculari, R. 1. L. 3.
F.	b.	2. Inermis Corni fœminæ folio.
A. 4. ♊	b.	3. . . . fol. ovato Lanceolato ſerrato, fructu aureo.
		CELTIS, Fr. *Micocoulier*, Eng. *Nettle-tree.*
F.	a.	1. Humilus virg.
A. 2.	a.	2. Fructu obſcure purpuraſcente, L & M. 1.
F.	a.	3. Pumila Helvetica.
		CENTAUREA, Fr. *Grande Centaurée.*
F. ♌ †	c.	1. Fol. tomentoſo fl. aureo, L. 16. *jacea arborea argentea.*
F. ♌ †	b.	2. . . . . . duplicato pinnato fl. purp. L. 7. æ.
F. ♌ †	b.	3. Eadem fl. ex rubro roſeo.
P. 5. ♌ †	a.	4. Orient. glaſti fol. fl. luteo, L. 30.
P. 2. ♌ †	a.	5. Alpinum fol. pinnatis Calice non ſpinoſa fl. aureo, R. 27.

Habitus	Cultuure	
P. 2. ♌ †	a.	6. Alpinum fol. pinnatis Calice ſpinoſa fl. aureo.
P. 3. ♌ †	a.	7. . . . . . . non ſpinoſa fl. flavo.
P. 3. ♌	a.	8. . . . . foliis folioſis fl. purp. capite ſpinoſa.
P. 3. ♌	a.	9. . . . . eadem fl. pallido.
P. 3. ♌	a.	10. . . . . majus fol. integris & diverſis capite non ſpinoſa, fl. purpureo.
P. 2. ♌	a.	11. Majus fol. lanceolatis integerrimus fl. purpureo.
P. 2. ♌ †	a.	12. . . . . lati fol. Caule alato fl rubro, Capite ſpinoſo, R. 24.

CEPHALANTHUS, Eng. *Button wood.*

F. ♌	a.	1. Fol. binis & ternis, L. 2.

CERASUS, Fr. *Cerisier*, Eng. *Cherry tree.*

F.	f. o. x.	1. Jamaiſenſis buxi folio, *malphigia*, *L.* 1.
A. 4. ♍	c.	2. Hottentorum fol. rotundo Craſſiſſimo *maurocenea* R. *Caſſine*, *L* 2.
F.	a.	3. . . . . oblongo, *olea*, *R.* 3. *L.* 2.
F. ♍ †	c.	4. . . . . humillima fol. oblongo Craſſo.
A. 4.	c.	5. . . . . fol. amplo oblongo, *arbor lacteſcens vulgo.*
A. 3. ♊ †	a.	6. Hortenſis fl pleno *Prunus*, *L.* 8. *γ.*
A. 3. ♊ †	a.	7. Affinis mahaleb dicta *prunus*, L. 5. *bois de St. Lucie.*
F. ♊ †	a.	8. Virgin. humilis fol. lanceolatis,
F.	f. c. x.	9. Jamaiſenſis, fol. lanceolatis.
A. 4.	f. c. x.	10. Amer. lauro Ceraſi fol. fructu purpureo racemoſo, *guajabara*, *M.* 1.

CERATONIA, Fr. *Carouge*, Eng. *St. John's bread.*

A. 4.	c.	1. Siliqua edulis, L.

[C]ERCIS v. Arbor Judæ.

CEREUS, Fr. *Cierge epineuſe*, Eng. *Torch-thiſtle.*

F.	c. o. ſſ.	1. Erectus Craſſiſſimus ſpinis albis. Cactus, R. 6.

2. Erec-

Habitus	Cultuure	
F.	e. *o*. *ſſ*.	2. Erectus gracilis ſpinis fuſcus, fl. flavo fructu purpureo.
F. ♍ †	d.	3. . . . ſeptem angularis fl. purpuraſcente *cactus*, *R.* 7.
		4. . . . fructu rubro non ſpinoſo, *cactus*, *R.* 4.
		5. . . . altiſſ. ſpinis flavis, *cactus*, *R.* 8.
		6. . . . polygonis ſpinis flavis.
		7. . . . . . . atroviridis ſpinis flavis.
		8. . . . . ſpinis fuſcis.
F.	e. *o*. *ſſ*.	9. . . . . gracilis ſpinis albis.
		10. . . . . gracilior. ſpinis albis.
		11. . . . . articulatis, ſpinis albis, *cactus*, R. 3.
		12. . . . octangularis ſpinis primis fuſcis deinde variegatis.
		13. . . . quadrangularis *Cactus*, R. 11. L. 4.
F. ♍ †	e. *o*. *ſſ*.	14. . . . græcilis polygonis, ſpinus fuſcis, fl. albo, *pyramidalis vulgo.*
P.	e. *o*. *ſſ*.	15. . . . gracilior, ſexangularis ſpinis fuſcis.
V. ♍ †	e. *o*. *ſſ*.	16. Schandens fl. amplo Luteo, *Cactus*, *R.* 10. *L.* 11.
V. ♊ †	d. *ſ*.	17. . . . . fl. pulchro purpureo, *Cactus*, *L* 12.
V.	d *o*. *ſſ*.	18. . . . trigonis articulatis, *Cactus*, *L.* 13.
V.	d. *o*. *ſſ*.	19. . . . eadem Eleganter variegato.
F.	f. *o*. *ſ*. *x*.	20. Scholopendriæ fol. brachiato, *Cactus*, *L.* 20.

CERINTHE, Fr. *Melinet*, Eng. *Honey Wort.*

P. 2. ♌	b.	1. Minor fl. flavo, R. 1.
P. 1. ♉ †	b.	2. Fol. ovatis petiolatis, R. 2. *pulmonaria*, *L.* 5. *Cerinthoides argentea*, *B.*
F. 2. ♌	b.	3. . . linearibus hiſpidis, L. 3.

CESTRUM v. Jasminum 14.

CHELIDONIUM MAJUS, Fr. *Eclaire*, Eng. *great ſelandine.*

CHAMÆROPS. v. Palma.

CHEIRANTHUS v. Leucojum

P. 2. ♊ †	a.	1. Flore pleno.

CHE-

Habitus Cultuure

CHELONE.

P. 2. ♌ † a. 1. Accadiensis fl. albo, L. 1.
P. 3. ♌ † a. 2. . . . . . purpureo M. appendix.
P. 1. ♌ † a. 3. Hirsutis, L. 2.

CHENOPODIUM.

F. ♍ a. 1. Frutescens sedi minori fol. R 12. L 17.
F. ♍ c. 2. . . . . . Caule infirmi sedi fol. Cericeis, L. 20.

CHÆROPHYLLUM, Pr. *Cerfeuil*, Eng. *Cow-weed.*

P. 3. ♋ a. 1. Perennis Cicutæ facie, R & L. 1.

CHIONANTUS, Eng. *Snow-drop-tree.*

A. 3. ♊ † a. 1. Virginiana lauro Cerasi fol. L. 1.
A. 3. ♊ † a. 2. Zeylanica Cotini fol. L. 2.

CHIRONIA.

F. ♉ † d. 1. Fol. linearibus fl. amplo ruberrimo, R. 1. L. 2. *Centaurium minus afric.* C.

CHONDRILLA, Eng. *Gum-succory.*

P. 2. ♌ † a. 1. Perennis humilior fl. Cæruleo, B. 1. *lactuca*, L. 6.

CHRYSANTHEMUM v. Leucanthemum. v. Santolina.

CHRYSOCOMA, Eng. *Goldyloks.*

P. 2. ♌ † a. 1. Calycibus Laxis, R. 1. L. 4.
F. ♉ † d. 2. Fruticoso fl. majore, R. 2. L. 1.
3. . . . minore.
4. . . . ante florescentiam reflexo. R. 3. L. 2.
5. . . . suffruticosis fl. aureo sæpæ geminato, L. 3.

CHRYSOPLENIUM, Eng. *Golden Saxifrage.*

P. ½. ♈ b. 1. Rotundi folia, L. 2.

Habitus Cultuure

CICHORIUM, Fr. *Chicorée*, Eng. *Succory.*

P. 2. ♋ † a. 1. Minus fol. magis lacineatis, B. 13.

CINCHONA, vel QUINQUINA.

F. e. 1. Officinalis, L.

CIRSIUM, Eng. *Gentle-thistle.*

P. 8. ♌ a. 1. Maximum asphoduli radice, B. 1. M. 3.

CISTUS, Fr. *Ciste*, Eng. *Rock-rose.* adde Helianthem...

F. ♌ † e.
1. Ladanifera fl. albo maculo punicanto, B. 1. L 3.
2. Eadem fol. angustiori.
3. Halimi folio, L. 9. æ.
4. Salvia fol. fl. albo, R. 5. L. 7.
5. Rosmarini fol. fl. albo, M. 7.
6. Fol. oblongo incano fl. purp. L. 7. M. 12.
7. . undulatis & Crispus fl. purp. L. 8. M. 4.
8. . . salvia brevioribus fl. rubro, B. 1.
9. . . salici angusto flore toto albo.
10. . . populi nigra fl. albo amplo, L. 1. æ. R. 1. M. 9.
11. . . rosmarini ampliore fol.
12. . . populi nigra fol. minore, L. 1. β. M. 10.

CITHAREXYLUM.

A. 3. e. 1. Amer. fol. ad marginem dentatis, L. 1.
A. 3. d. 2. Afr. lauri fol. non dentato, *leucoxylum fol. laurinis alternis acuminatis*, B. D. 10.

CITRUS v. Aurantia

CLEMATIS, Fr. *Clematite*, Eng. *Climber.*

V. ♎ ♑ † a.
1. Cæruleo vel purpurea, R. 5. L. 1.
2. . . . fl. pleno, B. 2. M. 9. L. 1. β.
3. Peregrina fl. albo, R & L. 6.
4. Fol. pinnatis fl. ex viridis albicante, L. 5. β. R. 3.
5. . . Compositis glabris, fl. albo odoratissimo L. Systema naturæ.

P. 2. ♌ † a. 6. Cærulea erecta, L. 9. M. 2.

Habitus	Culture	
P. 4. ♌ †	a.	7. Sive flammula ſurrecta alba, R 2. L. 8. M. 3.
V. ♏ †	b.	8. Fol. Cordatis Crenatis, R. 7. *atragana*, *L.* 2.
P. 2. ♌ †	a.	9. Surrecta alba Humilior, M. 3.
V. ♎ ♑ †	a.	10. Cærulea ſchandens fol. tenuis inciſis.

C L E T H R A.

F. ♋ †	a.	1. Floribus pentapetis albis, L.

C L I F F O R T I A.

F. ♌	d.	1. Fol. dentatis, R & L. 1.

C L I N O P O D I U M.

P. 2. ♍ †	a.	1. Fol. linearibus, R. 3. *Satureja*, L. 1. M. 8.
P. 3. ♍ †	a.	2. . . lanceolatis, L. 2. M. 9.

C L U T I A. adde alaternoides. 2

A. 4. ♀	d.	1. Fol. petiolatis, mas, } R. 1. L. 2.
		2. . . . . fœmina, } R. 1. L. 2.

COFFEA, Eng. *Coffee-tree*

A. 3. ♍	f. e.	1. Arabicum Caſtanea folio, *Jasminum*, *B.* 10. *M.* 12.

COLCHICUM, Fr. *Colchique*, Eng. *Meadow-ſaffron.*

B. ½. ♏ †	a.	1. Chionenſis fol. undulatis, R. 2. L. 3. M. 5.
		2. Fol. planis fl. pleno, L. 1. β. M. 3.
		3. Fl. pleno varieg. B. 5.
		4. . . . . purpuraſcento.
		5. Fl. Candido, B. 2. M. 2.
		6. . . . . . . fol. variegato, M. 6.
		7. . . . maculato.
		8. . . . variegato.
		9. . . . fl. purpuraſcente, L. 1. æ. M. 1.
		10. . . . ex albo & purpuraſcente mixto.

COLUTHEA, Fr. *Baguenaudier*, Eng. *Bladder-ſena.*

A. 4. ♋ ♏ †	a.	1. Veſicaria fl. luteo, L. 1. æ. M. 1.
F. δ †	c.	2. . . . . phæniceo, L. 2. M. 4.

3. Ve-

Habitus	Cultuure	
F.♄†	a.	3. Veſicaria orient. fl. ſanguineo notato, L. 1. β. M. 3.
A.4.♋♏†	a.	4. . . . virg. foliolis ovatis fl. luteo, M. 6.
P.♌†	d.	5. Herbacea Veſiculis Compreſſis, R & L. 3.
P.♌†	d.	6. . . . . parva Compreſſa, fl. ſpicato rubro.

COLLINSONIA.

P.3.♍†	a.	1. Virginiana, L. *fl. odoræ graveolente.*

COMA AUREA, Eng. *Goldylocks.*

F.♄†	d.	1. Afr. fol. in extremitatis trifidis, B. 4. *Santolina, L.* 6.
		2. . . . tenuiſſ. diviſo, *Santolina, L.* 5.
		3. . . . fol. Chritmi marini, B. 3. *Santolina, L.* 7.

GOMMELLINA.

P.½.♄	e.	1. Caule repente fl. luteo, L. 2.
P.2.♄	f.	2. . . erecta fl. Cæruleo, L. 4. M. 3.

CONOCARPODENDRON CONIFERA, vel LEPIDODARPODENDRON.

A.4.	d.	1. Fol. ſaligno, *Protea R.* 16. *Leucadendron, L.* 4.
F.	d.	2. Humilus fol. ſaligno hirſuto.

CONVALARIA, Fr. *Muguet*, Eng. *Lily of the Valley.*

P.½.♊†	a.	1. Latifolio fl. amplo, M. 3.
P.½.♊†	a.	2. . . . . pleno variegato, M. 4.
P.½.♊†	a.	3. Flore rubente, M. 2.
P.½.♊†	a.	4. Humilis fol. Cordato, L. 8.
P.2.♋	a.	5. Fol. alternis, L. 3.
P.1.♋	a.	6. . . Fol. alternis Elegantiſſ. varieg.
P.2.♋†	a.	7. . . . . . . fl. pleno, *polygonatum, B. & M.* 4.
P.1.♋†	a.	8. Floribus racemoſis, L. 7.
P.½.♊†	a.	9. Schapo nudo, L. 1.

Habitus	Cultuure	
		CONVULVULUS, Fr. *Liseron*, Eng. *Bind-weed.*
V.	f o. *f.*	1. Radice tuberosa, L. 7. *batatas americana.*
V. ♌ †	d.	2. Canariensis fl. purpureo, R. 5. L. 10.
V, ♍ †	d.	3. Schammonia dicta, R. 3. L. 3.
F. ♄ †	o.	4. Major Rectus Creticus argenteis, R. 11. L. 21.
F. ♄ †	c.	5. Argenteis fruticosis fol. linearibus, L. 22. R. 12.
P. ½. ♊ †	a.	6. Pumila argentea, fol. lanceolatis fl. albo, B. 6.
V. ♄ †	c.	7. Fol. hederæ fl. auzureo, L. 5.
V. ♋ †	c.	8. . . reni formi, L. 28. *soldanella marina.*
		CONYZA, Fr. *Conise*, Eng. *Flea bane.*
P. ½. ♋	d.	1. Cretica fol. molli Candidissimo, R. 2. L. 8.
		CORALLODENDRON, Eng. *Coral-tree.*
F.	e.	1. Fraxini fol. pubescentibus, *Sophora*, *L.* 2.
A. 4 ♌ †	e.	2. Am. spinosum fl. ruberrimo, M. 1. *Erythrina*, *L.* 2.
F.	e.	3. . . . . . spinis nigricantibus, M. 4.
P. 2. ♋ †	e.	4. Caroliniensis Radice Crassa, M. 3. *Erythrina*, L. 1.
F.	f.	5. Am. Caudice & nervi foliorum spinosis, M. 6.
F.	f.	6. . . non spinosum, M. 2.
		COREOPSIS, Eng. *Tiek-seeded sunflower.*
P. 4. ♄ †	a.	1. Virg. altissima fol. pinnatis linearibus in medio atropuniceis.
P. 1. ♄ †	a.	2. . . humilis fol pinnatis linearibus fl. aureo, L. 1.
P. 4. ♄ †	a.	3. . . fol. subternatis integerrimis, L. 2.
		CORIARIA, Eng. *Myrtle leavd sumach.*
F.	b.	1. Fœmina, L. 1. M. 2.

Habitus	Cultuure	
		CORNUS, Fr. *Cornouiller*, Eng. *Dogberry or Corneltree.*
A. 4. ♋	a.	1. Fœmina putata sanguineo [Virgin], L. 3.
A. 3.	c.	2. Amer. semper virens lauri folio.
A. 3. ♄ †	a.	3. Virg. fructu albo fl. umbellato Copioso.
A. 4. ♈	a.	4. Mas, L. 2. β.
		CORNUTIA.
A. 4.	e. o.	1. Fl. pyramidato Cæruleo, L. 1.
		CORONA IMPERIALIS.
B. 3. ♉ †	a.	1. Fl. luteo, M. 9.
		2. . . . . . pleno, M. 10.
		3. . . . rubro pleno, M. 3.
		4. . . . . . alato Caule, M. 6.
		5. . . . . . duplici Corona, M. 4 & 5.
		6. . . . . . fol. lato varieg. M. 7.
		7. . . . . . angusto varieg. M. 8.
		8. . . . . . maximo, M. 2.
		9. . . . . . & luteo mixto, M. 11.
		10. . . . . . & sulphureo mixto.
		(1.–10.: Petilium, R. Fritillaria, L. 1.)
		& quelques autres plus ou moins differentes.
		CORONA REGALIS.
B. 1. ♍ †	d.*	1. Racemo Comoso inferne nudo fol. Crenatis *fritillaria*, L. 2.
		CORONA SOLIS, Fr. *Soliel*, Eng. *Sunflower.*
P. 3. ♌ †	a.	1. Virg humilis, *heliantbus*, *L.* 7.
P. 8. ♌ †	a.	2. Late folio fl. pleno.
P. 4. ♍	a.	3. Virg. fol. lanceolatis alternis asperis.
P. 4. ♍ †	a.	4. Fol. lanceolatis radice repente, M. 7.
		CORONARIA.
P. 2. ♌ †	b.	1. Flore rubro pleno. *agrostema*, *L.* 3.
		CORONILLA, Eng. *Jointed podded Colutea.*
F. ♄ †	o.	1. Fruticosa stipula magna, L. 4.
F. ♄ †	c.	2. Hispanica frutescens major, L. 3.

Habitus Cultuure

F.♂† a. 3. Fruticosa, schorpioides major, L. 1. *Emerus, B.*

P.3.♂† a. 4. Herbacea, fl. vario, M. 3. L. 6. plantæ perennis.

CORTUSA, Eng. *Bears-ear sanicle.*

P.½.♊† a. 1. Fol. ovatis sessilibus, R. 2. *verbascum fl. borragini, B.* 10.

COTINUS, Fr. *Fustet*, Eng. *Venice sumach.*

A.3.♌† b. 1. Coriaria, B. *Rhus*, L. 12.

COTYLEDON. Eng. *Navel-wort.*

F.♂† d.*ſſ.* 1. Afr. fl. Crasso lacineato, R. 1. L. 6.

F.♋† d.*ſ.* 2. . . . orbiculatis limbus purp. cinctus, L. 1. æ. M. 9.

F.♋† d.*ſ.* 3. Eadem fol. utriumque cinereis.

F.♌† d.*ſ.* 4. Afr. fol. umbellato coccineo, M. 4. *Crassula*, L. 1.

F.♌ d.*ſ.* 5. . . . Crutiatis positis fl. ex albo virescente odorato, *crassula, R.* 7. *L.* 5.

F. d.*ſ.* 6. . . . minoribus Crassiss. viridioribus, M. 7. L. *Crassula, R.* 6. *L.* 4.

F.♌† d.*ſ.* 7. . . . longo & angusto fl. flavescente, C. tab. 23. L. 1. *β.*

F. d.*ſ.* 8. . . . minoribus oblongis, B. 6. *Crassula. R.* 4.

F. d.*ſ.* 9. . . . orbiculatis vel semi globati, M. 10. L. 2.

P.1.♋ a. 10. Major umbellicus veneris dicta, B. 1. L. 5. *β.* M. 1.

F. d.*ſ.* 11. Afr. Caule Crassa, fol. oblongo vel longo Lato, B. D. Tab. 18.

CRASSULA. *vid. Cotyledon.*

F.♍† d.*ſ.* 1. Altissima fl. albo umbellato odorato, R & L. 2. *aloe*, B. 12.

F.♍ d.*ſ.* 2. Fol. subulatis, R & L. 3.

P.½.♍ d.*ſ.* 3. Acaulos fol. subulatis radicatis, R. 4. L. 8.

4. Cau-

Habitus	Cultuure	
P. $\frac{1}{2}$. ♍	d. *ſ.*	4. Caule flaccida prolifera, R. 5. L. 9.
P. $\frac{1}{2}$. ♍	d. *ſ.*	5. Pumila fol. planis oblongis denticulatis.
F. ♍	d. *ſ.*	6. Fruticoſo fol. vermiculato.
P. $\frac{1}{2}$. ♍	d. *ſ.*	7. Acaulos fol. plano oblongo.
P. $\frac{1}{2}$.	d. *ſ.*	8. Caule flaccida repente, portulacea facie, L. 10. M. 8.
F.	d. *ſ.*	9. Arbor fol. oppoſitis obtuſis, R. 6. L. 4.
P. $\frac{1}{2}$. ♍	d. *ſ.*	10. Acaulos fol plano Craſſo Longiſſimo.
P. $\frac{1}{2}$. ♍ †	d. *ſ.*	11. Pumila fol. ovato, Craſſo perforato, fl. albo umbellato.

CRATÆGUS, Fr. *Aliſier*, Eng. *Wild-ſervice.*

F. ♊	a.	1. Fol ſubrotundo ſerrato ſubtus in canis, R. 1. L. 1. M. 2.
F. ♊	a.	2. Virgin. fol. tomentoſo, L. 5.
F.	a.	3. . . . . . oblongis ſerratis viridibus.
A. 3. ♊ †	a.	4. Fol obtuſis biſtrifidis, fl. pleno, *meſpilus*, M. 4.
A. 3. ♊ †	a.	5. . . . . . . fructu albo *meſpilus*, M. 15.
A. 3. ♊ †	a.	6. . . . . aureo.
A. 3. ♈ †	a.	7. Spina acuta biflora germanica *meſpilus*, M. 3.

CRINUM, Eng. *Lily aſphodel.*

P. 2. ♋ †	f. *o.* x. *ſ.*	1. Americanum, L. 3. æ. *lilio aſphodulis ſemper virens max. polyanthus albus*, C. tab. 14.
		2. . . . . . L. 3. β. eadem minus, C. tab. 15.
		3. . . . . . . majus fl. albo Caule purpurascente.

CHRITMUM, Fr. *Bacille*, Eng. *Samphire.*

P. 2. ♌	c.	1. Marinum odore api, L. 1.

CROCUS, Fr. *Saffran.*

B. $\frac{1}{2}$. ♍	a.	1. Sativus, vel ſafran vera, L. 1. œ.
		2. Pyrinæus autumnalis, M. 2.
		3. Montanis autumnalis, M. 3.

4. Ve-

A.4. a 8 Semper virens, pyracantha dicta, mespilus L. 2

Habitus Cultuure

C R O C U S.

B. ½. ♈ ♉ † a. 4. Vernum L. 1. β. Dont on trouve chez nous une Collection de 36. especes tant soit peu differente.

C R O T O L A R I A.

P. 2. b. 1. Caroliniensis fl. Cæruleo.

F. ♌ † f. o. x. {
2. Africana styraci fol. fl. Cæruleo, L 6. M. 3.
3. Asiatica fol. ternatis fl. luteo, L. 10. pubescente.
4. . . . . glabra.
}

Cucubalus v. Lychnis.

CUPRESSUS, Fr. *Cipres*, Eng. *Cypres-tree.*

Cucurbita v. Melopepo

A. 2. a. 1. Virginiana fol. acacia deciduis, L. 2.

F. ♉ b. {
2. Meta in fastigium Convoluta, L. 1. M. 1.
3. Ramos extra se spargens, M. 2 L. 1. β.
4. Meta in fastigium Convoluta non fructiferens. . . .
5. Nana fructu Cœruleo parva, L. ~~4.~~ 3
}

C U R C U M A.

P. 2. f. o. x. f. 1. Fol. lanceolatis, L. 2.

Cycas v. Palma.

CYCLAMEN, Fr. *Pain de pourceau*, Eng. *Sow-bread.*

b. 1. Hyemale fl. purpureo, M. 4.

B. ½. ♓ d.* {
2. Hyeme & vere florens fl. amplo albo odorato.
3. . . . . basi purpureo, B. 1. M. 5.
4. Eadem basi roseo.
}

B. ½. ♏ † b. {
5. Autumnalis hederæ fol. fl. Carneo, M. 1.
6. . . . . . . roseo.
7. . . . . . . albo, M. 2.
8. . . . fol. bipennis fl carnæo.
}

B. ♍ † b. {
9. Fol. orbiculatis estivum fl. purp. odorato radice anemone, B. 15.
10. Eadem radice rotundo.
}

Cynanchum v. Apocynum. 9. 16. Periploca.
Cynoglossum v. Omphalodes.

CYTISUS, Fr. *Cytise*, Eng. *Base trefoeil.*

F. ♉ † a. 1. Supinus fol. infra & siliquis molles, L. 6. æ.

A. 4. ♋ ♎ † c. 2. Canariensis sempervirens, B. 10. M. 5. genista, L. 1.

3. Gla-

A. 4. a 8. Semper virens hypocarpa ... [illegible] L. 2.

Habitus	Cultuure	
F. ♂ †	a.	3. Glaber nigricans, L 2. R. 2.
F. ♋ †	a.	4. Humilus glaber fl. pulchro aureo ſpicato.
A. 3. ♊ †	a.	5. Alpinus racemoſo fl. pendulo, L. 1. *Laburnum.*
A. 3. ♊ †	a.	6. Eadem fl. racemoſo pendulo magno, M. 1.
A. 4. ♋♎ †	c.	7. Ut No. 2. ſed in omni parte majoribus.
F. ♋	d.	8. Calycibus hirſutis ſeſſilibus, L. 5.

DAPHNE, Fr. *Garou*, Eng. *Mezereon.*

F. ♒	a.	1. Fl. racemoſo, ſemper virens, R. 1. L. 5.
F. ♒ †	a.	2. Floribus ſeſſilibus, R. 2. L. 1. *fl. purpureis*, M. 3.
F. ♒ †	a.	3. . . . . *fl. rubro*, M. 5.
F. ♒ †	a.	4. . . . . *fl. albo*, M. 4.

DELPHINIUM, Fr. *Pied d'alouette vivace.*

P. 1. ♌ †	a.	1. Fol. linearibus grandiflorum, L. 4.
P. 5. ♌ †	a.	2. . . palmatis fl. Cœruleo labi purp. fimbriato, L. 5.
P. 5. ♌ †	a.	3. Virg. altiſſ. fol. aconiti glabra fl. Cœruleo labi fimbriato.
P. 2. ♌ †	a.	4. Sybiricum humilis fl. Cœruleo Calcaris rugoſis.
P. 2. ♌	c.	5. Platani fol. ſtaphis agriæ dicta, L. 6.
P. 3. ♌ †	a.	6. Palmatis fol. magis inciſis.

DENSCANIS, Eng. *Dog' St. tooth.*

B. $\frac{1}{2}$. ♈ †	a.	1. Fl. albo, M. 1. 2. . . ſuave rubento, M. 4. 3. . . purpureo rubente, M. 2. 4. . . purpureo.	Erithronium, R & L.

DENTARIA, Fr. *Dentaire*, Eng. *tooth-Wort.*

P. $\frac{1}{2}$. ♊	a.	1. Fol. omnibus ternatis. R & L. 1. M. 5.

DIANTHUS v. Caryophyllus.

Habitus Cultuure

DICTAMNUS, Fr. *Origan*, Eng. *Dittany*.

P. ½. ♂ † d. 1. Creticus tomentosus, M. 1. *origanum*, *L.* 4.
P. ½. ♂ † d. 2. Montis sypili, M. 2. origanum, L. 5.

DICTAMNUS ALBUS, Fr. *Fraxinelle*.

P. 2. ♋ † a. { 1. Fl. albo. / 2. ., purpurascente. } L & R. 1.

DIERVILLA.

F. ♊ a. 1. Accadiensis fl. luteo R & M. 1. H. C. tab 7. *lonicera*, *L.* 14.

DIGITALIS, Fr. *Digitale*, Eng. *Fox glove*.

F. ♂ † d. 1. Acanthoides Canariensis, L. 4. *gesnerea*, *R.* 2.
P. 3. ♌ a. 2. Angusti fol. fl. ferrugineo, L. 3.
P. 2. ♌ a. 3. Foliis Linearibus floribus remotis.
P. 2. ♌ b. 4. Hispanica fl. flavescente, L. 2.

DIOSCOREA.

V. f. *o*. *x*. *ff*. 1. Malab. fol. cordatis, L. 6.
V. a. 2. Virgin. fol. cordatis acuminatis, L. 7.
V. f. *o*. *x* *ff*. 3. Zeylanica Caule bulbifero, L. 5.

DIOSMA.

F. ♂ † d. 1. Hirsutis odoratis, L. 2. M. 1. *spirea*, *C. tab.* 3.
F. ♂ † d. 2. Fol. subulatis acutis, L. 1. M. 2. *spirea*, *C. tab.* 1.
F. ♓ † d. 3. . . lanceolatis Ciliatis, L. 5.
F. ♂ † d. 4. . . . . glabris. odoratissimo, L. 6.

DIOSPYROS, Eng. *Indian date plum*.

A. 4. a. 1. Fol. Concoloribus, L. 2. M. 2.

DODARTIA.

P. 1. ♌ a. 1. Fol. linearibus, L. 1.

G

Do-

Diervilla: ... Caprifolium.

Habitus	Cultuure	
		DODONEA.
A. 4.	f.	1. Lauri oblongiore fol. Caule pubescente.
A. 4.	f.	2. . . . . . . Lucidis ex insulæ Caraibianæ.
		DOLICHOS, Fr. *Haricot*, Eng. *Kidney bean.*
V. ♍ †	d.	1. Caule perenni lignoso fl. purp. L. 9. H. C. tab. 20.
V. ♎ †	d.	2. . . . . . floribus luteis, L. 4. H. C. tab. 21.
		DORIA, Eng. *African Ragwort.*
F. ♄ †	d.	1. Frutescens Crassis & succulentis fol. B. 8. R. *otbonna*, *L.* 13. *a.* R. 2.
F. ♄	d.	2. . . . . coronopi folio, B. 13. *otbonna*, L. 12. R. 1.
F. ♄ †	d.	3. Afr. hederæ terrestri fol. B. 9. *otbonna*, *L.* 1. *Solidago*, *R.* 8.
F. ♄	d.	4. Fol. rigido angusto dentato.
F. ♄	d.	5. Afr. fruticoso fol. latissimo amplexi caule dentato.
		DORONICUM, Fr. *Doronic*, Eng. *Scorpion rooted.*
P. 2. ♋	a.	1. Fol. cordatis obtusus, L. 1.
		DORYCHNIUM, Eng. *Shrub trefoil.*
F. ♄	c.	1. Monspeliensis, R. 1. M. 1. *Lotus*, *L.* 15.
		DRACO ARBOR, Eng. *Dragon tree.*
A. 2.	e.	1. Foliis flaccidis, *Cordylene*, R. 1. palma, B 6. M. 8.
		DRACOCEPHALON, Eng. *Dragon's head.* add. Hyssopus.
F. ♄	c.	1. Fruticoso graviolente, R & L. 1.
P. 2. ♋ †	a.	2. Americ. Cornuti, R & L. 1.
P. 1. ♋ †	c.	3. Fol. linearibus fl. magno Cæruleo, L. 5. *Ruyschiana*, B.
P. 1. ♋ †	b.	4. Pumila magno flore, L. 4.

DRACONTIUM v. Arum

Habitus Cultuure

DRACUNCULOIDES, Fr. *Serpentaire.*

P. 1. ♌ † e. o. x. f. 1. Fl. Coccineis, B. *hæmanthus Colchici fol.* R. & L. 2.

ECHINOMELOCACTOS, Fr. *Melon-epineuse*, Eng. *Melonthistle.*

P. ½. ♉ f. o. ff.
- 1. Americana minor, B. 1. *Cactus*, R & L. 1. M. 5.
- 2. . . . . . major duodecem angularis, B. 2. *Cactus*, *R & L.* 2. *spinis albicantibus.*
- 3. . . . . eadem spinis ruberrimus.
- 4. . . . . . minor lanugunosis, proliferis spinis albicantibus, *cactus*, *M.* 6.

ECHINOPUS, Eng. *Globe thistle.*

P. 1. ♌ † a. 1. Pumila fl. albo, B. 4. F. *Echinops*, L. 2.

P. 3. ♌ † a. 2. Major, B. 2. *fl. purpurascente*, *Echinops*, *L.* 1.

P. 2. ♌ † a. 3. Floribus Corymbosis, *Echinops*, L. 4.

ECHIUM, Fr. *Viperine*, Eng. *Viper s'bugloss.*

F. ♌ d. 1. Afr. fruticans fol. pilosis, R. 5. L. 1.

ELÆAGNUS, Fr. *Olivier sauvage*, Eng. *Wild olive.*

A. 2. a. 1. Fol. molli in canis, R & L. 1.

ELICHRYSUM, Fr. *Immortelle*, Eng. *Eternal flower.*

F. ♄ † d. 1. Frutescens fl. Corymbosis toto aureo, B. 2. *gnaphalium*, R. 11. L. 13.

F. ♄ c. 2. Fol. stæchados Citrina fl. aureo, R. 18. *gnaphalium*, *R.* 15. L. 14.

F. ♄ † c. 3. Afr. fol. oblongo tomentoso fl. luteo, B. 14. *gnaphalium*, R. 18. L. 26.

F. ♄ c. 4. . . . . subtus Cano supra viridis fl. luteo, B. 12. *gnaphalium*, R. 17. L. 23.

F. ♌ † d. 5. . . . argent. repens fl. pulchro magno, B. 15. *xeranthemum*, *R.* 2. L. 6.

P. 2. ♌ ↔ † b. 6. Orient. fl. ignescente ex aureo Rutilante, B. 3. *gnaphalium*, *R.* 12. L. 21.

F. ♌ † d. 7. Afr. fruticos. Caule alato fl. umbellato *gnaphalium*, L. 27.

8. Afr.

Habitus	Cultuure	
F. ♌ †	d.	8. Afr. fruticoſ. fol. parvis Crenulatis fl. albo umbellato.
P. ½. ♊ †	a.	9. Montanum fl. ſuaviter rubento, B. 7. *gnaphalium*, *L.* 28.
P. 2. ♋ †	a.	10. . . . . . rotundiore Candido, B. 6. *gnaphalium*, L. 1.
F. ♌	d.	11. Fruticoſum fl. ſingulari, *gnaphalium*. *R.* 13. *L* 36.
F. ♌ †	d.	12. Fol. lineari fl. rubello poſteo aureo, *gnaphalium*, *B* 16. L. 20.
P. 1. ♌ †	c.	13. Orient. humilis, fl. amplo toto aureo.
F.	d.	14. Afr. fruticoſo fol. rotundiori parva Subtus incanis ſupra viridib.
F. ♌	d.	17. . . . . . tomentoſum fol. undulatis fl. ſpecioſo, *gnaphalium*. *B. D. tab.* 80.
		E P H E M E R U M.
P. 1. ♉ †	a.	1. Virginian. fl. azureo, B. 1. *tradeſcantia*, *R* & *L*.
P. 1. ♉ †	a.	2. . . . . . pallido Cœruleo.
		E P H E D R A.
F. ♌	a.	1. Mas, L. 1.
		E P I M E D I U M.
P. ½. ♉ †	a.	1. Alpinum, R & L.
		E R I C A, Fr. *Bruyere*.
F. ♓ †	c.	1. Afr. arbor tenui fol. R. 4. L. 6.
P. 1. ♌ †	a.	2. Vulgaris fl. albo, L. 1.
		E R I O C E P H A L U S.
F. ♍	d.	1. Africanis fruticoſis, L. 1.
		E R Y N G I U M, Fr. *Panicaut*.
P. ½. ♍	b.	1. Pumila Caule dichotomo, R. 4.
P. 2. ♎	b.	2. Ameri. Juccæ fol. R. 5. pag. 529.
P. 3. ♍	a.	3. Fol. radicalibus ovalis planis Crenatis, R. 1.
P. 3. ♍	a.	4. Eadem Caule & flore amathyſtini, B. 5.

Habitus	Cultuure	
		ERYSIMUM, Fr. *Tortellæ.*
P. 1. ♋ †	a.	1. Barbaræa fl. luteo pleno pulcherrimo.
		EUONIMUS, Fr. *Fusain.*
A. 4. ♊	a.	1. Vulgare fol. variegatis.
A. 4. ♊	a.	2. Latifolio, B. 2. L. 1. β.
A. 4. ♊	a.	3. Fol. ovato dentato Caule rigido fl. ex viridis rubello.
V.	a.	4. Virgin. scandens lauri folio.
A. 4. ♊	a.	5. Vulgaris, L. 1. æ.
		EUPATORIUM, Fr. *Eupatoire.*
P. 4. ♍	a.	1. Urticæ fol. Canad. fl. albo, R. 2.
P. 4. ♍ †	a.	2. Nova angliæ urticæ fol. rugosis fl. albo amplo.
V.	c.	3. Caule volubili, R. 4. L. 2.
P. 4. ♍ †	a.	4. Virg. fol. ternis & quaternis fl. purp. R. 3. L. 11. β.
P. 6. ♍ †	a.	5. . . . eadem in omni parte majoribus, L. 11. æ.
P. 5. ♍ †	a.	6. Fol. digitatis, R. 1. L. 10.
		EUPHORBIUM.
F. ♌	e. o. ∬.	1. Aculeata semi nudo, R. 1. L. 7. *nerii fol.* B. 11.
F.	f. o. ∬. x.	2. . . . . triangulari ramos spargens, R. 2. L. 1. æ. *schaddi d'acalli dicta.*
		3. . . . . erectis, L. 1. æ.
F.	e. o. ∬.	4. . . . . quadrangularis & quinquang. R. 3. L. 2.
F. ♌	e. o. ∬.	5. Heptagonum spinis longiss. in apice frugiferis, B. 4. R & L. 3.
F.	e. o. ∬.	6. Cereii effigui Caulibus Crassioribus, L. 6.
F. ♌	f. o. x ∫. *	7. Cotini folio, R. 11. L. 14. *titbymalus*, B. 27.
F.	f. o. ∬. *	8. Curassav. myrti ampliori fol. R. 10. L. 12. æ. *titbymalus*, B. 1.

9. Poly

Habitus	Cultuure	
F. ♌ †	e. o. ſſ.	9. Polygonum ſpinoſum Caule tuberibus ornato, R. 6. L. 4.
F. ♌ †	d. ſ.	10. Caule ſquamato tuberoſo, B. 6. fl. albicante, L. 8. æ.
F.	f. o. x ſ.*	11. Curaſſavica lauro Ceraſi folio, M. 2. L. 8. æ.
F. ♌ †	d. ſ.	12. Caule ſquamoſo minus, B. 7. fl. viridi, L. 8. β.
P. 1. ♌ †	d. ſ.	13. Eadem Capite meduſœ effigui, R. 7. L. 8. δ.
F.	d. ſ.	14 Caule ſquamoſo in fini rami-ſe ſpargenſ. L. 8. ζ.
P. 1. ♍ †	d. ſ.	15. . . . . . erecta, fl. ex albo & roſeo mixto, B. D. tab. 7. fig 2.
F.	e. ſ.	16. . . . . . Volubilis.
P. $\frac{1}{2}$. .	d. ſ.	17. . . . . . Capite meduſæ effigui, humillima ramis proliferis, B. D. tab. 9. fig. 1.
F.	f. o. ſ.	18. Fili formi erecta, L. 11.
F.	e. o ſ.	19. . . . Volubilis, L. 9.
F.	e. o. ſ.	20. . . . flaccida, L. 10.
P. 1. ♋ †	b.	21. Characias amygdaloides, L. 54.
P. 2. ♋	b.	22. Umbella multifida, L. 49.
P. 2 ♋	b.	23. Afr fruticoſa oblongo folio.
P. $\frac{1}{2}$. ♋	b.	24. Fol. pini, L. 56. R. 23.
P. $\frac{1}{2}$. ♋	b.	25. Sylvaticus lunata flore, L. 55. *tithymalus*, *B.* 37.
F. ♌	e. ſ.	26. Afr. Caule Coralli Colore, L. 44. *tithymalus*, B 14.
F. ♌	d. ſ.	27. Indicus fruteſc: pentaphyllos *tithymalus*, *B.* 28.
F. ♌ †	d. ſ.	28. Orient. ſalice fol. fl. magno, R. 28. *tithymalus*, *B.* 31.
F. ♈ †	b.	29. Arboreus fol. glauco anguſto, L. 46. *tithymalus*, *B.* 6.
F. ♊	b.	30. Fol. lini rotundiori, L. 29. β. *tithymalus*, *B.* 38.
F. ♊	c.	31. . . . acutiori, L. 29. æ *acuta*.

32. Fru-

Habitus	Cultuure	
F. ♁	d. *ſ.*	32. Fruticoſis fol. parvis lanceolatis Capſulæ villoſo.
P. 1. ♋	a.	33. Characias amygdaloides fol. Eleg. varieg. *tithymalus*, *B.* 3.
		F A B A G O.
P. 3. ♌ ⇸	a.	1. Belgarum, B. 1. *zygophyllum*, L & R. 1.
		2. Afr. fl. ſulphureo fructu rotundo, B. 2, *zygophyllum*, R. 2 L. 3.
F. ♁ †	d.	3. . . . luteo fructu globoſo, B. 3. *zygophyllum*, *L.* 4 *fabago*, *B. D. tab.* 3. *fig.* 1.
		4. . . arboreſcens, B. D. tab. 3. fig. 2. *zygophyllum*, *L.* 2.
		5. . . . . . ramis longiſſimus fl. aureo.
		FAGOPYRUM, Fr. *Ble ſaraſin.*
V.	d.	1. Schandens lignoſo, fol. lanceolatis, *polygonum*, *L.* 18.
		FAGUS, Fr. *Hetre.* adde Castanea.
A. 2.	a.	1. Fol. atro puniceis.
		FERULA, Fr. *Ferule.*
F. ♍	d.	1. Galbanifera vera ſemper virens fol. & caule rore Cæruleo cinctus, B. 5. *bubon*, *R &* *L.* 2.
P. 2. ♍	c.	2. . . . fol. myrhidis, B. 9. *bubon*, *R.* 4. *L.* 3.
P. 3. ♍	a.	3. . . . foliolis pinnatifidis, R & L. 4.
		FICOIDES, B. Meſymbreanthemam, R & L.
F. ♌	d. *ſ.*	1. Spinis ramoſis fl. Cæruleo, B. 18. R. 3. L. 17.
F. ♌	d. *ſ.*	2. Fl. umbellato obſoleti Coloris, R. 4. L. 16.
F. ♁ †	d. *ſ.*	3. Fol. varieg. aſpero fl. violaceo, B. 11. R. 5. L. 10. æ.
F. ♁ †	d. *ſ.*	4. Caule lanuginoſo fl. violaceo; B. 8. R. 7. L. 11. æ.

5. Ca-

Habitus	Culture	
F. ♌ †	d.ſ.	5. Caryophyli fol. fl. luteo magno, B. 1. R. 2. L. 35.
P. ½. ♉ †	d.ſ.	6. Acaulus Craff. latiff. & lucidis fol. fl. aureo amplo, B. 5. R. 8 L. 34. β.
P. ½. ♉ †	d.ſ.	7. . . . . . lucidis fl. aureo, B. 7. L. 34. γ.
P. ½. ♉ †	d.ſ.	8. . . . . lucidis difformis fl. aureo, B. 9. L. 34. δ.
P. ½. ♌	d.ſ.	9. . . . fol. lanceolatis planis fl. amplo albo, R. 11. L. 7.
P. ½. ♉ †	d.ſ.	10. . . . bellidi florum, B. 13. L. 8.
F. ½. ♍ †	d.ſ.	11. . . . eadem in omni parte majoribus.
F. ♍ †	d.ſ.	12. Fol. glauco perfoliato apice spinoso, fl. Cæruleo, B. 17. R. 16 L. 14. β.
F.	d.ſ.	13. . . . . . . Cortice lignoso Candido, B. 15. L. 14. æ.
F. ♉ †	d.ſ.	14. Fol. securi formi fl. aureo stellato, in medio nocto aperto, B. 14. R 17. L. 32.
P. ½. ♊	d.ſ.	15. Acaulos fol. semi Cylindraceo fl. aureo, R. 23. L. 26.
F. ♉ †	d.ſ.	16. Frutescens fl. phæniceo filamentis atris, R. 30. L. 24.
P. ½. ♉ †	d.ſ.	17. Acaulos fol. triangulari brevi Crasso dentato fl. aureo, B. 12. *rictum felinum referens*, L. 31. β.
P. ½. ♌ †	d.ſ.	18. . . . fol. triang. longissimo fl. aureo ad solem aperto, R. 12. L. 31. *rictum Caninum dictum*.
P. ½. ♌ †	d.ſ.	19. . . . fol. triang. prope summittate dentato fl. luteo.
P. ½.	d.ſ.	20. . . . fol. aspero ad apicem stella spinosa ornato, L. 10. β.
F. ♊ †	d.ſ.	21. Fl. amplo luteo extus linea rubro picta, B 6. R. 21. L. 29. æ.
F. ♋ ↛	d.ſ.	22. Noctu florens odoratissimo, B. 1. R. 28. L. 4.
F. ♌	d.ſ.	23. Neapolitana fl. Candido, B. 15. R. 22. L. 3.

Habitus	Cultuure	
F.♌†	d.ſ.	24. Fol. triang. ſchabro tenui fl. violacco, B. 23. R. 20. L. 13.
P.♉†	d.ſ.	25. . . longo tenui fl. auranteo, B. 5.
F.♌†	d.ſ.	26. . . . . . coccineo, B. 7. R. 26. L. 17.
F.♉.†	d.ſ.	27. . . . aſpero fl. violaceo, B. 24.
F.♌	d.ſ.	28. . . tereti glauco apice purp. Craſſo, fl. aureo, B. 3. R. 24. L. 27.
F.♍	d.ſ.	29. . . triang. fructu maximo eduli, B. 3.
F.♍	d.ſ.	30. . . . enſiformi fl. ampliſſ. purp. B. 4. R. 18. L. 21.
F.♉	d.ſ.	31. . . . acini formi fl. purp. filamentoſo, R. 5. R. 19. L 20.
F.♌†	d.ſ.	32. . . . dorſo lato parum excavato, B. 9. fl. violaceo, L 9. γ.
F.♌†	d.ſ.	33. . . . . . ad tres margine aculeato, B. 21. R. 14. L. 9. β.
F.♌	d.ſ.	34. . . . glauco breviſſ. admargine non ſpinoſo, fl. violaceo, B. 22.
P.½.♌†	d.ſ.	35. Fol. tereti procumbens fl. violaceo, B. 6. L. 19.
F.♊†	d.ſ.	36. . . triang. Erecta fl. luteo magno, B. 7. R. 27. L 28.
F.½.	d.ſ.	37. Repens fol. triangulari longiſſimo, L. 29. β.
F.♌†	d.ſ.	38. Fruticoſo fol. tereti fl. ſuave rubento.
F.♌†	d.ſ.	39. . . . . . longiſſimo fl. aureo ampliſſimo.
F.♉†	d.ſ.	40. . . . . . . fl. intus aureo foris purpureo, L. 22.
F.♉†	d.ſ.	41. Cauli infirmi fl. albo umbellato, L. 5.
F.♌†	d.ſ.	42. . . . fol. triquetris lateribus planis fl. violaceo.
F.♌†	d.ſ.	43. Humillima fruticoſo, fol. triang. brevi fl. pulchro violaceo.
F.♌†	d.ſ.	44. Caule infirmi fol. Calendulæ fl. aureo, B. 3. R. 10. L 30.
F.	d.ſ.	45. Fruticoſis fol. planis linearibus.
P.½.♌†	d.ſ.	46. Caule infirmi fol. retuſo, fl. Eleg. Carnæo.

F i-

Habitus	Cultuure	
		FICUS, Fr. *Figuier.*
A. 3.	f. *o. x.*	1. Folis nymphe, R. 1. L. 2.
A. 4.	e. *o.*	2. Malabarensis fol. Cuspidato, R & L. 3.
A. 3.	e. *o.*	3. Bengalensis fol. subrotundo, R & L. 4.
A. 4.	e.	4. . . . . . lanceolatis. R & L. 5. β.
A. 4.	b.	5. Fructu maximo purp. B. 1. } L. 1.
A. 4.	b.	6. . . . albo, B. 2. } L. 1.
A. 4.	f. *o. x.*	7. Fol. ovatis integris fruc. racemoso, L. 6.
		FILIX, Fr. *Fougere.* Filago v. Santolina.
P. $\frac{1}{2}$.	d.	1. Amer. humilis fronde dubia, nova species.
		FILIPENDULA, Eng. *Meadow sweet.*
P. 2. ♌	a.	1. Fol. pinnatis, R. 1. *spiræa*, *L.* 9.
P. 2. ♌ †	a.	2. Eadem fl. pulcherrimo pleno.
P. 4. ♌	a.	3. Foliolis impari trifido, R. 2. *spiræa*, L. 10.
P. 4. ♌ †	a.	4. Eadem fl. pulcherrimo pleno, M. 2.
P. 2. ♌	a.	5. Foliis ternis, R. 3. *Spiræa*, *L.* 11. *Hypecacuantha dicta.*
		FRAGARIA, Fr. *Fraisier.*
P. $\frac{1}{4}$.	a.	1. Caule decumbente, L 3. 2. Chilœnsis fructu maximo monstroso fol varieg. 3. . . . . L. 1. y. 4. Americana fr. maximo glabra. 5. Alpinum, semper florens & fructiferens.
		FRANGULA.
A. 4. II	a.	1. Alnus nigra baccifera, B. *Rhamnus*, *L.* 3.
		FRAXINUS, Fr. *Frene.*
A. 2. II	a.	1. Carolinienfis plumosis, L. 2.
A. 1.	a.	2. Ex nova angliæ, pinnis foliorum in mucronum productioribus, L. 3.

Habitus Cultuure

FRITILLARIA, Fr. *fritillaire.* add. Corona Regal. Imper.

B. 2. ♊ b. 1. Radice rotundo, R. 1 L. 3. *lilium persicum.*
B. 2. ♊ † a. 2. R 2. L 5. Dont on trouve chez nous une Collection de plus que 100 Especes; tant soit peu differente.

FUMARIA, Fr. *Fume-terre.*

P. ½. ♉ † a. 1. Schapo nudo, R & L. 1.
P. ½. ♁ † a. 2. Semper virens fl. albo, B. 5. } L. 4.
P. ½. ♁ † a. 3. . . . . , luteo, B. 6.
P. ½. ♉ a. 4. Radice Cava major, R 2. L. 3. æ.
P. ½. ♉ † a. 5. . . . non Cava fl. rubello, L. 3. β.

GALE, Eng. *Candleberry myrtle.*

A. 3. ♊ c. 1. Caroliniensis baccifera, B. 1. *myrica*, L. 2.
F. ♊ a. 2. Odoratissimo septemtrionalis, *myrica*, L. 1.

GALANTHUS, Fr. *Perce niege.*

B. ½. ♈ † a. { 1. Trifolium minus, R & L. *leucoium bulbosum minus*, B.
2. Eadem fl. pleno.

GALEGA.

P. 3. ♌ † a. { 1. Fl. Candido, B. 2. } L. 1.
2. . . cæruleo, B. 1.

GALENIA.

F. ♁ d. 1. Frutescens, odorato, R & L.

GALEOPSIS.

P. 2. ♋ a. 1. Alpina betonice fol. fl. rubro maculato, B. 14.
P. 2. ♋ † a. 2. Urtice fol. fl luteo maculato, B. 10. L. 4.
P. 2. ♋ † a. 3. Eadem fol. Eleg. varieg. B. 11.

GALLIUM, Fr. *Caillelait.*

P. 2. ♌ † a. 1. Fol plurimis linearibus fl. luteo, R. 1. L. 11.
P. 2. ♌ a. 2. . . nervosis fl. albo, R. 8. L. 16.
P. 1. ♌ a. 3. . . . parvis fl. albo, *Cruciata*, B. 2.

GE-

GARDENIA v. Jasminu. 15

Habitus	Cultuure	
		GENISTA, Fr. *Genet*, Eng. *Broom.* add. CYTISUS.
F. ♌ †	b.	1. Hispanica fl. luteo odorato, B. 1. M. 1. *spartium*, R & L. 1.
F. ♌ †	b.	2. . . . . pleno, M. 13.
F. ♌ †	a.	3. Tinctora germanica, R. 1. L. 4. M. 7. 4. . . . austriaca maxima, M. 6. 5. Lusitanica, M. 4. 6. Schoparia, *spartium*, *R.* 4. *L.* 7. 7. Lucensis, M. 10. 8. Ramis triangularis, R & L. 2. 9. Tinctora germaeica maxima, M. 5.
		GENTIANA, Fr. *Gentiane*, Eng. *Felwort.*
P. 3. ♍ †	a.	1. Major lutea officinalis, R & L. 1.
P. 2. ♍ †	b.	2. Latifolio fl. punctato, B. 7. swertzia, R & L 1.
P. ½. ♊ †	a.	3. Alpina magno flore, B. 4. R. 5. L. 8.
P. ½. ♋ †	a.	4 Floribus Confertis terminatricibus, R. 4. L. 20.
		GERANIUM, Fr. *Bec de gruë*, Eng. *Crane's bill.*
F. ♄ †	d.	1. Afr. frutescens alchimillæ hirsuto fol. fl. rubro magno, B. 17. R. 24. L. 7. 2. . . . . alchimillæ fol. fl. rubicundis, L. 11. 3. . . . . eadem fol. Eleg. varieg. B. 3. M. 30. 4. . . . . fol. alchimillæ fl. rubello purpurascente. 5. . . . . . . Eleganter kermosino. 6. . . . . ex pallide luteo varieg. fl. kermosino. 7. . . . . . fl. Elegantiss. kermosino, L. 3.
P. 1. ♄ †	d.	8. . . myrhidis folio fl. magno striato, L. 5. β. 9. . . Coriandri fol. fl. magno striato, L. 5.
F. ♄	d.	10. . . noctuolens tuberosum & nodosum, R. 27. L. 8.

Habitus	Cultuure	
F. ♄	d.	11. Afr. fol. Craſſo glauco fl. ſuave rubento, R. 19. L. 10.
F. ♄ †	d.	12. . . . . inferiori aſari, ſuperiore ſtaphidis agriæ, R. 27. L. 9.
F. ♄	d.	13. . . . . cordatis lobatis Crenatis piloſis, R. 21. L. 13.
F. 1. ♄	d.	14. . . . . molli Craſſo, odoratiſſimo, R. 29. L. 15.
F. ♌ †	d.	15. . . . . alceæ fl. coccineo fulgidiſſimo, R. 23. L. 2.
B. 1. ♍	d.	16. . . . noctuolens vitis folio, R. 18. L. 1.
F. ♄	d.	17. . . . fol. alceæ fl. albo ſemper florens, B. 25.
B. 1. ♍	d.	18. . . . noctuolens myrhidis fol. fl. albicante, L. 1. y. M. 36.
		19. . . . . . anemone fol. fl. rubello, B. 11. } L. 1. β.
		20. . . . . . paſtinace fol. fl. pallido, B. 12. } L. 1. β.
F. ♄	d.	21. . . . malvæ læcineato fol. odoræ Meliſſe, B. 7. L. 12.
P. 1. ♄ †	d.	22. Hæmatodes fl. variegato, L. 38. β.
P. 1. ♄	d.	23. Afr. fol. orbiculatis piloſis fl. albo, R. 30. L. 14.
P. 1. ♄	a.	24. Pumila aconiti ſol. fl. rubro, L. 28.
P. ½. ♄ †	a.	25. Fol. diſſectus maximo flore Cæruleo. } L. 35.
		26. . . . . pallido. } L. 35.
P. 3. ♋ †	a.	27. Batrachoides fl. Cæruleo, M. 1. } L 29.
		28. . . . . variegato, M. 3. } L 29.
P. 2. ♋ †	a.	29. Phæum fl. ferrugineo, L. 26. β.
		30. . . . . pallide rubello, L. 26.
B. 1. ♍	d.	31. Afr. noctuolens ut No. 19. ſed folio glabro.

Geum v. Caryophyllata. GEINERIA v. Digitalis.

GLADIOLUS, Fr *Glaieul*, Eng. *Cornflag*.

Habitus	Cultuure	
B. 2. ♌ †	c.*	1. Maculam Rhomboideam inſcriptus, R. 1. L. 1. H. C. tab. 6. Mill. 142 2
B. 3. ♌	c.*	2. Afr. fl. ſulphureo.
B.	c.*	3. . . . caule maculato.
B. 2. ♌ †	c.*	4. . . . calice luteſcente, petalæ rubello Eleg. maculato, fol. linearibus.
B. 1. ♌ †	c.*	5. . . . fl amplo albicante.

6. Afr.

Habitus	Cultuure	
B. 1. ♌ †	c.*	6. Afr. fl. amplo cinereo.
B. 2. ♌ †	c.*	7. . . Caule ſparſa fl. albicante roſeo, R. 4. L. 5.
B. 3. ♌	b.	8. . . fl. purpureo, M. 3.
B. 4. ♌	c.*	9. Maximus indicus, M. 6.
B. 3. ♌	b.	10. Biſantinum major fl. purp. M. 4.
B. 2. ♌	b.	11. Fl. Carnæo, M. 2. } L. 1.
		12. . . albo. } L. 1.
		13. . . purpureo. } L. 1.

GLEDITSIA v. Acacia. 1. 2

GLORIOSA, R & L.

R. V. ♍ †	f. o. x. ſſ.	1. Lilium Zeylan. ſuperbum, *methonica malabarorum.*

GNAPHALIUM v. Elichrysum.

GOSSYPIUM, Fr. *Cotton*, Eng. *Cotton.*

GLYCINE v. Apios, Abrus. — v. Phaseoloides.

F. ♍	f. o. x.	1. Arboreum, L. 3.
		2. Fruticoſum, L. 2. perennis.

GOMPHRENA v. Amaranthoides.

GRAMEN.

P. 4. ♍	a.	1. Latiori fol. Eleg. varieg. *phalaris*, *L.* 3. *β.*
P. 3. ♍	a.	2. Anguſtiore Eleg. varieg. folio.

GRANADILLA, Fr. *Fleur de la paſſion*, Eng. *Paſſion flower.*

V.	e.	1. Fol. oblongo ſerrato, *paſſiflora*, *R & L.* 1.
V.	f. o. x.	2. . . tricuſpidi obtuſo & oculato, B. 9. *paſſiflora*, B. 2.
V. ♍ ↔ †	b.	3. Pentaphyllos fl. Cæruleo, B. 1. M. 2.
		4. . . . . latioribus fol. fl. Cæruleo magno, B. 2. M. 1. *paſſiflora*, R. 4. L. 42.
R. 3. ♍ †	e.	5. Triphyllos fl. roſeo Clavato, M. 4. *paſſiflora*, R. 5 L. 21.
R. ♈ ♍ ↔ †	a.	6. Fol. tricuſpidi fl. parvo flaveſcente, M. 5. *paſſiflora*, R. 7. L. 15.
V. ♍ ↔ †	b.	7. Pentaphyllos fl. albo magno, B. 7.
V. ♍	e.	8. Fol. amplo tricuſpidi fr. olivæ formæ, M. 11. *paſſiflora*, *R.* 6. *L.* 16.
		9. . . anguſto trifido, fl. parvo gemino, M. 12. *paſſiflora*, L. 16. *β.*

10. Ha

Habitus Culture

V. ♍ † c. *o.* 10. Fol. hastato, fl. ex purp. & luteo Variis, M. 14. *passiflora*, *R.* 8. *L.* 17.

Grewia v. Guidonia.

GROSSULARIA, Fr. *Grosselier*, Eng. *Goosberry.*

F. ♊ a. 1. Virginiana fructu spinoso, *Ribes*, *L.* 8.

GUAJABARA, Eng. *Sea-side grape.*

A. 4. g. 1. Fol. subrotundis, M. 3. R. pag. 534. *uvifera*, *H. C. polygonum*, *L.* 26.

GUAJACUM, seu LIGNUM VITÆ.

A. 4. e. 1. Lentisci fol. fl. Coccineo, L. 3.

GUAJAVA, Fr. *Goiave*, Eng. *Guava.*

A. 4. ♍ † f. { 1. Alba dulcis, M. 1. *psidium*, L. 1. β.
2. Rubra acida, M. 2.

GUIDONIA.

A. 4. ♌ ↔ † d. 1. Ulmi fol. fl. roseo, M. 1. *Grewia*, *L.* 1.

GAURA.

P. 8. ♍ a. 1. Fol. lanceolatis fl. pallide rubello.

HALLERIA, Eng. *African fly honeysuckle.*

F. ♍. c. 1. Fl. ruberrimo, R & L. 1. æ.

HAMAMELIS, Eng. *Witch hazel.*

A. 4. ♓ a. 1. Coryli folio, L. 1.

HÆMANTHUS, Eng. *Blood-flower.* add. Dracunculoides

B. $\frac{1}{2}$. ♏ † d. * { 1. Afr. lingui fol. schapo uniflora, L. 1.
2. . . . undulatis.

HÆMATOXYLON, Eng. *Campechy-wood.*

F. f. 1. Seu Lignum Campechianum, R & L. 1.

HEBENSTRETIA.

F. ♊ ♍ † d. 1. Fol. dentatis, L. 1.

HE-

Habitus Cultuure

HEDERA (COMMUNIS,) Fr. *Lierre*, Eng. *Ivy tree.* add. Vitis.

F. a. 1. Minor fol. ex albo Eleg. varieg. B. 5. M. 3.
F. II a. 2. Arborea fructiferens, M. 2.
F. II b. 3. . . . . . . fol. ex albo Eleg. variegatis.

HEDYSARUM, Eng. *French honeysuckle.*

P. 1. ♌ † e. 1. Fol. simplicibus ovatis, R. 1. L. 5.
P. 3 ♌♓ † b. { 2. Clypeatam fl. suaviter rubente, R. 5. L. 28.
3. . . . albido, B. 4. M. 2
P. 3. ♍ † b. 4. Triphyllum Canadensis fl. purp. L. 16. M 4.
P. 3. ♍ † d. 5. . . . . Caule frutescente, fl. rubro, L. 17.

HELENIA, Eng. *Willow Leavd sun flower.*

P. 8. ♎ † a. { 1. Fol. linearibus, M. 1. } *helenium*, *L.* 1.
2. . . lanceolatis, M. 2.

HELIANTHEMUM, Eng. *Dwarf cistus.*

P. ½. ♌ † c. { 1. Orient. olea fol. fl. albo. } *cistus*, *L.* 26.
2. . . . . . aureo.
3. . . . . . pallide rubello.

HELICTERES. HELIANTHEM v. Corona Sol

F. e. o. 1. Fol. Cordato serrato, L. 1.

HELIOCARPOS.

F ♍ † f. o. x. 1. Americana, L. 1.

HELIOTROPIUM, Fr. *Herbe aux verrues*, Eng. *Turn sole.*

F. ♉ † e. o. { 1. Fruticosum, spicis Conjugatis odoræ vanillas.
2. . . . . . simplicibus, *Tournefortia*, L. 5.

HELLEBORINE, Fr. *Elleborine*, Eng. *Bastard hellebore.*

P. ½. ♋ a. 1. Latifolia, B. 1. M. 1. *serapias*, *L.* 1. *a.*
P. 1. ♌ a. 2. Angusti folia, B. 4. *serapias*, *L.* 1.

Habitus	Cultuure	
		HELLEBORUS, Fr. *Ellebore*, Eng. *Christmas flower*.
P. 2. ♋	a.	1. Niger fœtidus, L. 4.
P. 1. ♓	a.	2. . . . fl. viridi, L. 3.
P. $\frac{1}{2}$. ♒ †	a.	3. . . . . albo vel roſeo, L. 2.
P. 2. ♊ †	a.	4. . . . luteo globoſo, R. 5. *trollius*, *L.* 1.
Hemerocallis v. Lilioasphodelus.		HEPATICA, Eng. *Noble Liverwort*.
P. $\frac{1}{2}$. ♓ †	a.	1. Fl. Cæruleo, M. 1. } hepaticæ R. anemone, L. 1.
		2. . . . pleno, M. 2.
		3. . . rubro pleno, M. 5.
		4. . . albo vel Carnæo, M 3.
		5. . . rubro, M. 4.
		HERMANNIA.
F. ♉ †	d.	1. Fol. oblongo ſerrato, R. 3. L. 4.
		2. . . . . . latiore, R. 1. L. 3.
		3. . . ibici hirſuto fl. aureo, R. 2. L. 1.
		4. Eadem fl. primo aureo deinde purpuro rubello.
		HERMODACTYLUS, Eng. *Snakes-head iris*.
B. 1. ♊ †	b.	1. Fol. quadrangulare, B & M. *iris*, *R.* 12. L. 15.
		HERNANDIA, Eng. *Jack in a box*.
A. 2.	f *o. x.*	1. Ampſo hederæ folio, umbilicato, R & L. 1.
		HEUCHERIA.
P. 1. ♊	a.	1. Fl. ſquallide purpureis, R & L. 1.
		HIBISCUS. adde althaea.
P. 3. ♎	b.	1. Populi fol. fl. roſeo, R & L. 1.
A. 4. ♉ †	e.	2. Fl. miniato Clauſo, R. 2. L. 8.
A. 4.	e.	3. Chinenſis fl. ſimplici, R. 3. L. 7.
		4. . . . pleno, B. 6.
F. ♍ †	e.	5. Papaya fol. fl. magno flaveſcente fundo purpureo, L 13.
P. 2. ♎	b.	6. Ut, No. 1. fl. albo.

7. Ame-

Habitus	Cultuure	
F. ♍ †	e.	7. American. fol. Cordato - quinquangularibus omnium maximum.
F. ♍ †	e.	8. . . . . . fol. Cordato - quinquang. villosis Caule maculato fl. amplo sulphureo.
F.	e.	9. Zeylanica Caule spinoso, R. 7. L. 10.
F.	e.	10. Fol. Cordato subrotundo, L. 4.
F. ♍ †	e.	11. . . quinquangularibus, fl. amplo flavo pendente, L. 16.

HIERACIUM, Eng. *Hakweed.*

P. 1. ♂ †	c.	1. Pulchrum ramosum lanuginosum, R. 3. L. 24.
P. 1. ♂ †	a.	2. Pilosum fl. coccineo, R & L. 9.
P. 1. ♋	a.	3. Alpinum maculatum, fl. luteo, L. 4.
P. ſ. ♌	a.	4. Altissima fol. lanceolatis fl. luteo.
P. ½. ♋	a.	5. Alpinum pumilum fl. magno aureo, L. 3.

HURA, Eng. *Sand-box-tree.*

A. 2.	f. *o. x.*	1. Abutili fol. R & L.

HYACINTHUS, Fr. & Eng. *Jacinthe.*

B. 1. ♉	a.	1. Corollis Campanulatis fl. albo, M. 2, } R. 3. L. 1.
B. 1. ♉	a.	2. . . . . . . carnæo, M. 3. } R. 3. L. 1.
B. 1. ♉	a.	3. . . . . . . Cæruleo, M. 1. } R. 3. L. 1.
B. ½. ♂ †	d.*	4. . . . oblongis, suaviter rubento, L. 2.
B. ½. ♊ †	a.	5. Floribus paniculatis monstrosis, R. 5. L. 7.
B. ½. ♉	b.	6. Muscari fl. ex Cæruleo virescente, } L. 6. R 4.
B. ½. ♉	b.	7. . . . . . luteo virescente, } L. 6. R 4.
B. ½. ♈ †	a.	{ 8. Stellatis fl. Cæruleo. 9. . . . . delute Cæruleo. 10. . . . . Carnæo. 11. . . . . ex albido. 12. . . . . suave rubento. } Schilla, R. 4. L. 6.
B. ½. ♉	a.	13. Botrioides obsoleto Cæruleo, R. 1. L. 12.
B. ½. ♉	a.	14. . . . . . albo, R. 6. L. 9.

Habitus	Cultuure	
B. ½. ♉	a.	15. Botrioides fl. carnæo. } R. 6. L. 12.
		16. . . . Cæruleo. }
B. 1. ♉	a.	17. Corallis Campanulatis amathyſtini, L. 4.
B. ½. ♉ †	d.*	18. Afr. fl. pendulo coccineo oris flavis.
B. ½. ♈	a.	19. Flore borragini.
B. 1. ♉ †	b.	20. Orientalis, R. 2 L. 5. Dont on trouvera ci aprez un denombrement des plus beaux & plus precieux Eſpeces qui ſont Connue Jusqu'ici en Hollande, & dont on peut avoir annuellement les Catalog. ſpecificque avec leur plus bas prix.

HYDRANGEA.

F. ♌ †	a.	1. Virg. fl. umbellato, L. 1.

HYDROPHILLON, Eng. *Water Leaf.*

P. ½. ♊	a.	1. Morini, R & L. 1.

HYOCYAMUS, Fr. *Jusquiane*, Eng. *Hen-bane.*

F. ♂ †	d.	1. Creticus luteo major, R. 3. L. 3. æ.

HYPERICUM, Fr. *Millepertuis*, Eng. *St. John's Wort.*

P. ½. ♌ †	b.	1. Orient. fl. magno, R. 7. L. 6. addc Afcyrum
P. 2. ♌ ↔	a.	2. Aſcyron dictum Caule quadrangulari, R. 4. L. 13.
P. ½. ♌ ↔	a.	3. Fœtidum fruteſcens, R. 9. L 8.
F. ♂ †	a.	4. Canarienſis multiflorum, R. 8. L. 7.
F. ♌ †	a.	5. Fructu baccato, R. 3. L. 5.
P. ♌ †	a.	6. Amer. magnum baniſteri.

HIPPOPHAË, Eng. *Sea-bucktborn.*

F. ♊	a.	1. Salice folio Mas, L. 1.

HYSSOPUS, Fr. *Hiſope.*

P. 2. ♌ †	b.	1. Arabum Rubro flore, L. 1. β. M. 3.
P. 1. ♌ †	b.	2. Spicus interruptis. R. 1. *dracocephalum*, L. 4. *Ruyſchiana*, B & M.
P. 1. ♌	a.	3. Lopanthus, L. 2.

4. Flo-



† e. 14. Fol. lauri fl. virescente noctu odoratissimo *Cestrum*, *L.* 1. *nocturnum*.
15. Malabaricum, lauri fol. fl. albo pleno odoratissimo, *gardenia*, *dicta*.

P. 1. Ω †	b.	2. Spicus interruptis. R. 1. *dracocephalum Ruyschiana*, B & M.
P. 1. Ω	a.	3. Lopanthus, L. 2.

Habitus	Cultuure	
P. 2. ♌	a.	4. Flore Cæruleo, L. 1. M. 1.
P. 2. ♌	a.	5. . . . . albo, M 2.
		JACOBEA, Fr. *Jacobée*, Eng. *Ragwort.*
F. ♌	b.	1. Maritima minor, B. 7. *Solidago*, *R.* 7. *othona*, *L.* 9.
F. ♌	b.	2. . . . . . fol. Eleg. varieg.
F. ♌	b.	3. . . . . latifolia, B. 8. M. 10.
		JALAPPA, Fr. *Belle de nuit*, Eng. *Marvel of peru.*
R. 4. ♍ †	e. ʃʃ.	1. Fl. albo tubo longo, odoratissimo, M. 7. *mirabilis*, L. 1. β.
R. 3. ♍ †	e. ʃʃ.	{ 2. . . albo, M. 3. 3. . . . . . & purp. striato, M. 5. } mirabilis, L. 1. Nyctage, R.
R. 4. ♍ †	e. ʃʃ.	{ 4. . . purpureo, M. 2. 5. . . luteo, M. 1. 6. . . . . . & rubro striato. }
		JASMINUM, Fr. & Eng. *Jasmin.*
F. ♌ †	b.	{ 1. Vulgatius fl. albo odorato, R & L. 1. 2. . . . . eadem fol. ex aureo varieg. M. 2.
F. ♌ ♑ †	c.	{ 3. Hispanica fl. albo magno externe Rubento, B. 2. M. 6. 4. Azoricum fl. albo odorato, R & L. 2. M. 9. 5. Eadem fol. ex aureis varieg.
F. ♉ †	c.	6. Humila luteum, R. 5. L. 4. M. 4.
F. ♉ †	b.	7. Luteum odorato, baccifera, L. 3. R 3.
A. 4. ♁ †	c.	{ 8. Indicum flavum odoratum, R. 4. L. 5. *major.* 9. Eadem minore & fructiferens.
F. ♁	d.	10. Ilici fol. fl. albo, B. 6. *Lantana*, R. 3. L 7.
F. ♁ †	e.	11. Arabicum fl. albo odoratissimo, M. 10. *Nyctantes*, L. 2.
F. ♍ †	e.	{ 12. Fol. pishaminis fl. albo, *Brunsfelsia*, L. 1. 13. Laureolæ fol. fl. Candida, *Cestrum*, *L.* 2. *diurnum.* 14. Fol. lauri fl. virescente noctu odoratissimo *Cestrum*, *L.* 1. *nocturnum.* 15. Malabaricum lauri fol. fl. albo pleno odoratissimo, *gardenia*, *dicta.*

Habitus	Cultuure	
		JATROPHA, Eng. *Physic-nut.*
F.	f. *s.*	1. Americana goſſipi fol. R. 1. L. 3.
F. ♍ †	f. *s.*	2. . . . . . multifido, fol. R. 2. L. 4.
F. ♍ †	f. *s.*	3. . . . . . lacteſcens & urens, L. 3. L. 6.
F. ♍	f. *s.*	4. . . . . . ſtaphidis agriæ fol. R. 5. L. 1.
		IBERIS, Eng. *Sciatica Creſſ.*
F. ♑ †	b.	1. Fol. Cunei formibus, R & L. 1. } thlaſpi ſemper virens.
F. ♑ †	c.	2. Eadem fol. Eleg. varieg. B. 2. }
P. ½. ♊ †	a.	3. Fol. linearibus, R & L. 2. }
		ILEX, Fr. *Chenevert*, Eng. *Ever-green-oak.* *adde CASSINE*
A. 4.	b.	1. Cocciglandifera, M. 5. *quercus*, *R.* 8. *L* 6.
		2. Fol. lanceolatis
		3. . . agrifolii, M. 3.
		4. . . oblongo ſerrato, M. 2. L. 3.
		IMPERATORIA, Eng. *Maſter-Wort.*
P. 2. ♋	a.	1. Major, R. L & M. 1.
		INDIGOPHORA, Eng. *Indigo.*
F. ♑	f. o.	1. Fruticoſo ſiliqua falcata, L 1. M. 2.
		IPOMŒA.
V.	e. x.	1. Solani fol. fl. roſeo, L. 9.
		IRIS, Fr. *Flambe*, Eng. *Flower de luce.* *add. Hermodactylus.*
R. 2. ♋ †	b.	1. Suſiana fl maximo, L. 1. M. 6.
B. ½. ♈ †	b.	2. Perſicum fl. variegato, R. 13 L. 17. *Xiphion*, *M.* 1.
P. 2. ♌	b.	3. Alba florentina, M. 4.
P. 2. ♋ †	a.	4. Latifolio petalis ex atro purp. & albo ſtriato, B. 4. M. 11.
P. 3. ♋ †	a.	5. Latifol. petalis repandis atro purp. vietis Erectus obſolete purpuraſcentibus, B. 8. M. 5.
P. ½. ♉	a.	6. Humilus fl. purpureo, B. 21. L 14. Chamæiris dicta.

7. Hu-



B. 23. } L 14. Chæ-
, B. 24. } mæiris dicta.
eo, B. 17. *Caule trian-*

eo ſtriato, B. 18.
, utrumque variis,

eno ex rubro, roſeo;

ccimeo rubro & luteo

repandis albis, Erec-

leo.
ultifloro folio unico
ule orto.
vo albeſcente.

x aureo & purp. va-

ureo.
. ſtriatis, M. 33.
leo odorato, M. 53.
e ſuave, M. 27.

lont on trouve une
s tant ſoit peu dif-

quelles on trouve
ection de plus que
é raviſſante.

albis, L & M.

ut,
go profundiſſimo

2. Amer.

Habitus Cultuure

JATR

F. f. *ſ.* 1.

F. ♍ † f. *ſ.* 2.

F. ♍ † f. *ſ.* 3.

F. ♍ f. *ſ.* 4.

IBE

F. ♂ † b. 1

F. ♂ † c. 2

P. $\frac{1}{2}$. ♊ † a.

ILEX, Fr.

A. 4. b.

IMPERA

P. 2. ♋ a.

IND

F. ♂ f. *o.*

V. e. *x.*

IRIS,

R. 2. ♋ † b.

B. $\frac{1}{2}$. ♈ † b.

P. 2. ♌ b.

P. 2. ♋ † a.

P. 3. ♋ † a.

P. $\frac{1}{2}$. ♉ a.

Habitus	Cultuure	
P.½.♉	a.	{ 7. Humilus fl. variegato, B. 23. } L 14. Chæmæiris dicta. { 8. . . . . albeſcente, B. 24. }
P.1.♌	a.	9. Anguſti fol. fl. Cæruleo, B. 17. *Caule triangulari.*
P.3.♌†	a.	{ 10. . . . . Cæruleo ſtriato, B. 18. { 11. . . . . . utrumque variis, B. 19.
B.2.♋†	b.	12. Bulboſa hiſpanica fl. pleno ex rubro, roſeo, & albo mixto.
B.2.♋†	b.	13. . . . fl. pleno ex coccimeo rubro & luteo mixto.
P.1.♄†	e.	14. Afr. Caule ſparſa petalis repandis albis, Erectus Cæruleo notato.
R.3.♌	d.*	15. . . Corallifera fl. Cæruleo.
B.½.†	d.*	16. . . imberbis, Caule multifloro folio unico lineari, ex ſummo Caule orto.
B.½.♋	d.*	17. . . uni fol. fl. parvo flavo albeſcente.
B.½.♋	d.*	18. . . pumila fl. ferrugineo.
P.1.♌.†	b.	19. Latifolia humilior, fl. ex aureo & purp. varius, M. 36.
P.2.♌†	a.	20. Sybirica, fl. pulchro purpureo.
P.2.♌†	a.	21. Latifolia belgica fol. Eleg. ſtriatis, M. 33.
P.1.♌†	a.	22. Virg. pumila fl. purp. Cæruleo odorato, M. 53.
P.2.♌†	a.	23. Latefolio fl. Cæruleo odore ſuave, M. 27.
P.2.♌	a.	24. Germanica, M. 28. L. 2.
B.2.♋†	b.	25. Bulboſa hiſpanica dicta, dont on trouve une Collection de 50 Eſpeces tant ſoit peu differente.
B.2.♌†	b.	26. Bulboſa angliæ dicta, des quelles on trouve auſſi chez nous une Collection de plus que 50 Eſpeces d'une beauté raviſſante.

I T E A.

F.♌†	a.	1. Virginiana floribus ſpicatis albis, L & M.

JUGLANS, Fr. *Noyer*, Eng. *Walnut*.

A.2.♊	a.	1. Amer. nigra fructu oblongo profundiſſimo inſculpto, M. 6.

2. Amer.

Habitus	Cultuure	
A. 4. ♃	a.	2. Amer. alba fructu minore Cortice glabro, M. 9.
A. 2. ♃	a.	3. . . . nigro fr. rotundo profundissimo insculpto, M. 5.
A. 4. ♃	a.	4. . . . alba fructu minimo putamine teneriore, M. 10.

Juniperus, Fr. *Genevrier*. add. CEDRUS SABINA

A. 3. ♃	b.	1. Virgin. fol. inferioribus Juniperinum, superioribus Cupressum referentibus, R. 3.
A. 3. ♃	b.	2. . . . toto Juniperino, M. 3.
A. 2.	c.	3. Bermudiana, R. L & M. 5.
A. 4. ♃	a.	4. Vulgare, mas, L. 8.
		5. . . . fœmina, L. 8.
A. 4. ♃	b.	6. Virg. baccis albis.
A. 4. ♃	b.	7. Major, baccis rufescente, M. 8. L. 1.
A. 4. ♃	b.	8. . . , fructu flavescente, M. 13. L. 9.

JUSTICIA v. Adhatoda.
IVA v. Parthenium.

Ixia.

B. ½. ♋	d.*	1. Gramen tomentosum pumilum dictum, R & L. 1.
P. 2. ♌ †	b.	2. Fl. rubro & luteo Eleganter punctato, L. 2.
B. 1. ♋ †	d.*	3. . . aureo maculis purp. insignito.
B. ½. ♋ †	d.*	4. . . sulphureo, ad tres petalæ maculato.
B. 1. ♌	d.*	5. Afr. Cœpæ fol. fl pallido sulphureo.
B. 2. ♌ †	d.*	6. . . Caule bulbifera fl. toto albo.
B. 2. ♌ †	d.*	7. . . . . . . albo extus violaceis.
B. 2. ♌ †	d.*	8. . . . . cinereis.
B. ½. ♌ †	d.*	9. . . fl amplo coccineo.
B. ½. ♌	d.*	10. . . fol. lineari fl. Cæruleo parvo.
B. ½. ♌ †	d.*	11. . . . . . . amplo.
		12. . . fol. palmæ fl. Cæruleo.
		13. . . . . . purpureo.
		14. . . . . . pallide purp.
		15. . . . . . purp. holoserico.
		16. . . . . . fl. Cæruleo maculis Coccineo insignito.

17. Afr.

roſeo.
e.
odorato.
gans.
ido.

eganter bulla·

galange dicta.

c.
c.

is obvallatis,

l. 1. *Cacalia*,

2. M. 2. Caca-

cacalia, *L.* 4.

latis.
ngis.
nardus ame-
s.
crenatis, *Ca-*
ruca v. Chondrilla

ANA v. Jasminum.
Viburnum.

abies, *R.* 4.

vatis obtuſis

La-

Habitus C

A. 4. ♊ a.

A. 2. ♊ a.

A. 4. ♊ a.

A. 3. ♊ b.

A. 3. ♊ b.

A. 2. c.

A. 4. ♊ a.

A. 4. ♊ b.

A. 4. ♊ b.

A. 4. ♊ b.

JUSTICIA v. Adhat

IVA v. Parthenium

B. ½. ♋ d.

P. 2. ♌ † b.

B. 1. ♋ † d.

B. ½. ♋ † d.

B. 1. ♌ d.

B. 2. ♌ † d.

B. 2. ♌ † d.

B. 2. ♌ † d

B. ½. ♌ † d

B. ½. ♌ d.

B. ½. ♌ † d



Habitus	Cultuure	
B. $\frac{1}{2}$. ♌ †	d.*	17. Afr. iridis fol. fl amplo pallido roſeo.
		18. . . . . paivo albicante.
		19. . . fol. palmæ hirſutis fl. roſeo odorato.
		20. . . iridis folio fl. Cæruleo Elegans.
		21. . . . . . Cæruleo pallido.
		KALMIA.
A. 3.	b.	1. Semper virens lauri fol. fl. Eleganter bullatis, L. 2.
		KÆMPHERIA.
R. ♌ †	f. *o.* *x.*	1. Fol. ovatis ſeſſilibus, R & L. 1. galange dicta.
		KIGGELARIA.
A. 3. ♍	c.	1. Mas, R & L. 1.
		2. Fœmina, R & L. 1.
		KLEINIA.
F.	e. *o.* *ſ.*	1. Caule Carnoſo petiola truncatis obvallatis, R. 1. M. 4. *cacalia* *L.* 1.
F. ♍ †	d. *ſ.*	2. Fol. lanceolatis planis, R. 1. M. 1. *Cacalia*, *L.* 3.
F.	d. *ſ.*	3. . . planis oblongis ovatis, R. 2. M. 2. *Cacalia*, *L* 2.
F. ♎ †	d. *ſ.*	4. . . Carnoſis lanceolatis, R. 3. *cacalia*, *L.* 4. *Senecio*, *C* *tab.* 40.
F.	d. *ſ.*	5. Fruticoſis fol. Carnoſis vermiculatis.
P. $\frac{1}{2}$. ♎ †	d. *ſ.*	6. Pumila fol. Carnoſis ovatis oblongis.
P. 8. ♎	a.	7. Caule herbaceo fol. ſubcordato, nardus americana procerior, *Cacalia*, *L.* 5.
P. 6. ♎ †	a.	8. . . . . . Elipticis ſubcrenatis, *Cacalia*, *L.* 5. *[manuscript: LACTUCA v. Chondrilla]*
		LAMIUM, Eng. *Dead-nettle.*
P. 1. ♂	a.	1. Fl. albo fol. variegato. *[manuscript: LANTANA v. Jasminum. Viburnum.]*
		LARIX, Fr. *Meleſe*, Eng. *Larch.*
A. 1.	a.	1. Fol. deciduo, Conifero, M. 1. *abies*, *R.* 4. *pinus*, *L.* 7.
		2. Amer fol. deciduo, Conis ovatis obtuſis nigra.
		3. Syberienſis.

Habitus	Cultuure	
		LASERPITIUM.
P. 2. ♋ †	a.	1. Lucidum B. 8.
P. 2. ♋	a.	2. Foliolis ramoſis ſeſſilibus, L. 3. R. 2.
P. 2. ♋	a.	3. Extremis lobulis breviter multifidis.
		LATHYRUS.
R. V. ♌ †	a.	1. Perennis fl. purpureo majore, L. 18.
R. V. ♌	a.	2. . . . . . minore, B. 2.
R. V. ♌	a.	3. . . . vicia fol. fl. luteo, L. 16.
		LAURUS, Fr. *Laurier*, Eng. *Bay tree.* *adde Benzoin. Camphorif.*
A. 3. ♍	c.	1. Americana, R. 2. L. 5. *Cinnamomum ſpuria*
A. 3.	c.	2. Caroliniensis fol. acuminaris, R. 5. L. 7. *Borbonica dicta.*
A. 3.	c.	3. Latifolio, M. 7. & 8. *nobilus vulgo*, *L.* 4.
A. 3. ♊	b.	4. Vulgaris, R. 1. M. 1 & 2.
A. 4.	c.	5. . . . fol. Eleganter varieg. B. 5. M. 3.
A. 3. ♊	b.	6. Foliis undulatis, B 8. M. 4. & 5.
A. 4. ♊	c.	7. Tenui folio, B. 9. M. 6. & 7. baccifera dicta.
A. 3. ♊	b.	8 Racemifera fœmina.
A. 4.	b.	9. Ceraſus fol. varieg. *Padus*, *R & M.* 1.
A. 4. ♋	a.	10. . . . luſitanica minor, Padus, M. 5. R. 3. *prunus*, *L.* 3.
A. 4. ♋	a.	11. . . . fol. lanceolatis, *Padus*, *M.* 4. *R.* 2. *prunus*, *L.* 4.
A. 4.	b.	12. Fol. integris trilobisque, L. 10. M. 11. *Saſſafras officinarim.*
A. 4.	f. o. x.	13. . . enervi ovatis obtuſis, L. 11. *Winteranus Canella alba officin.*

LAVATERA v. Althaea, Malva

Habitus	Cultuure	
		LAVENDULA, Fr. *Lavande*, Eng. *Lavender.*
P. 1. ♋	a.	1. Anguſti fol. fl. albo, B & M. 4.
F. ♂ †	c.	2. Fol. pinnatis dentatis, R & L. 3. *ſtæchas*, *B.* 2.
F. ♂ †	c.	3. . . lanceolatis ſpica Comoſa, R & L. 4. *ſtæchus*, *B.* 1.

4. Fol.

Habitus	Cultuure	
F. ♄ †	d.	4. Fol. tenuis diſſectis ſpico multiplici, M. 7.
P. 1. ♋	a.	5. Anguſti fol. fl. Cæruleo, M. 2. L. 1.

LENTISCUS.

A. 4. ♊	c.	1. Vulgaris mas ; M. 1. B. 2. } *Piſtachia, R.* 3. *L.* 5.
		2. . . . . fœmina, M. 2. B. 1.
F. ♊	c.	3. Omnium minimum.

LEONURUS, Fr. *Queue de lion*, Eng. *Lion'ſtail.*

F. ♏ †	c.	1. Sederitis fol. fl. phæniceo, R & M. 1. *phlomis*, *L* 12.
F. ♌ †	d.	2. Nepetæ fol. fl. phæniceo, B. 2. M. 3. *phlomis*, *L.* 11.
F. ♌ †	d.	3. Afr. abſinthi fol. fl. rubro.

LEUCANTHEMUM, Fr. *Marguerite*, Eng. *Ox eye daiſy.*

F. ♄	d.	1. Canar. fol. glauco Craſſo, M. 6. *Chryſanthemum*, *R.* 6. L 1.
P. 1. ♄ †	c.	2. Pumila fol glauco pinnafidis fl amplifſimo.
P. 2. ♋	a.	3. Tanaceti fol. fl. majore, B. 10.
P. 1. ♋	a.	4. Bellidis ſerrato folio fl. amplo, *chryſanthemum*, *L.* 3.
P. 1. ♄	c.	5. Fruticoſo fol: pinnatis, *Cryſanthemum*, *L.* 12.

Leucotenodrum v. Conocarpod

LEUCOIUM, Fr. *Giroflier*, Eng. *Stock gilliflower.*

F. ♄ †	c.	1. Arbor in canum fl. albo pleno, M. 8. } Cheirantes R. 3. L. 4.
		2. . . . . . rubro pleno, M. 7.
		3. . . . . . . varieg. pleno.
		4. . . . . . . purp. pleno, M. 6.
		5. . . . . varieg. pleno.
F. ♊ †	c.	6. . . . latefolium fl. pleno ex atro ex aureo Mixto.
F. ♊ †	c.	7. . . . anguſtifolium fl. pleno ex atro & aureo Mixto.

Habitus Cultuure

F. ♊ † c. 8. Arbor fol. Eleg. variegatis fl. luteo pleno, M. 26.

F. ♄ † c. { 9. . . . fol. viridi fl. albo pleno, M. 16.
10. . . . . . rubro pleno.
11. . . . incanum fl pleno ferrugineo Coloræ,

LEUCOIUM (BULBOSUM,) Fr *perceniege.*

B. ½. ♓ † a. 1. Bulbosum majus, B. 2 *leucoium*, *L.* 1.
B. 2. ♊ a. 2. . . . multiflorum, *leucoium*, *L.* 2.

LIGUSTRUM, Fr. *Troêne*, Eng. *Privet.*

A. 4. ♋ † a. { 1. Foliis ex aureis variegatis, M. 3.
2. Semper virens, M. 2.
3. Foliis ex argenteis varieg. M. 4.
4. Vulgare, M. 1. L. 1.

LILAC.

A. 4. ♊ † a. { 1. Fl. Cæruleo, M. 1. / 2. . . albo, M. 2. } *syringa*, L. 1. R. 1.

F. ♉ † a. { 3. Persarum fl. Cæruleo, M. 6. / 4. . . . albo, M. 8. } *syringa*, R. 2. L 2. æ.

F. ♉ † b. 5. . . . fol. Lacineato, M. 7. *syringa*, R. 3. L. 2. β.

A. 4. ♊ † a. 6. Fl. saturate purpureo, M. 3.

LILIUM, Fr. *Lis*, Eng. *Lily.*

B. 3. ♌ † a. { 1. Album fol. varieg. M. 5. B. 2.
2. . . . . . fl. pleno.
3. . . . maculato, B. 3.
4. . . . flore pleno, B. 4. M. 2.
5. . . . fl. variegato, B. 19. M. 6. } lilium, L. 1. Lirium, R. 1.

B. 2. ♌ † a. { 6. Croceum majus, M. 7.
7. . . . . polyanthos, M. 22.
8. . . . . fol. Eleg. varieg. M. 20. } lilium, L. 2. lirium, R. 2.

9. Mar.

Habitus Cultuure

Martagon vulgo.

9. bisantinum miniatum, B. 16. M. 18. L. 4. æ.
10. . . . . . polyanthos, B. 12. M. 17. L. 4. β.

B. 3. ♌ † a. 11. . . . fl. flavo maculis nigris, M. 19.

12. floribus reflexis albis, B. 9. M. 13.
13. . . . . . punctatis, B. 8. M. 12.
14. . . . . purp. pleno M. 14.

B. 4. ♍ † a. 15. . . . . luteis punctatis, L. 6. *canadensis maior*

B. 3. ♍ † a. 16. . . . . pumila *canadensis minor* & plusieurs autres especes tant soit peu differente dont on trouve annuellement le specification, aux Catalog. des oignons.

Lilio Asphodilus, Fr. *Lis-asphodele*, Eng. *Day lely*.

R. 3. ♋ † a. 1. Luteis, B. 1. *hemoroccallis*, M. 1. L. 1. æ.
2. Puniceis, B. 2. *hemoroccallis*, M 2. L. 1. β.

R. 1. ♋ † a. 3. Fl. albo magno *hemorocallis*, L. 2. *liliastrum*, B.

Lilio Gladiolus.

B. 2. ♋ † d.* 1. Fol. quadrangularis biflorus noctu odorato.
2. . . . . . multiflora noctu odorato.
3. . . . . . fl. ferrugineo Coloræ.

Lilio-Hyacinthus, Fr. *Lis-Jacinthe.*

B. 1. ♋ † b. 1. Fl. Cæruleo, B. 1. *scilla*, R 2. L. 4.
2. . . purpureo magno *scilla*, R. 2. L. 4.

Limonium, Eng. *Sea Lavender.*

P. 1. ♉ † d. 1. Peregrinum aspleni fol. B. 7. M. 6. *statice*, *R.* 3. *L.* 13.

F. ♍ d. 2. Lignosum gallum ferens, B. 6. M. 7. *statice*, *R.* 3. *L* 11.

P. 2. ♌ † a. 3. Maritimum majus, B. 1. M. 1. *statice*, *L.* 1. *æ.*

Habitus Cultuure

P. 2. ♌ † b. 4. Caule nudo ramoſo, M. 2. *ſtatice*, *L.* 1. *γ.*
P. ½. ♍ d. 5. Afr. parvum fol. roſmarini tenuiore.
P. ½. ♋ a. { 6. Gramineum globoſum fl. albo *ſtatice*, *L.* 1.
7. . . . . rubra *ſtatice*, *L.* 1.

LINGUA CERVINA, Fr. *Langue de Cerf*, Eng. *Hatt's tongue.*

P. 1. ♊ a. { 1. Multifido folio, B. 10. *aſplenium*, *L.* 3. ε.
2. Fol. undulato, B. 5. *aſplenium*, L. 3. γ.
3. . . maximo, ſupra in amplas lacineas foliaceis Explicato, B. 15. *aſplenium*, *L.* 3. ζ.
4. Officinarim, *aſplenium*, *L.* 3 æ.

LINUM, Fr. *Lin*, Eng. *Flax.*

P. 2. ♋ c. 1. Perennis major Cæruleo, B. 6. L. 2.
P. 3. ♉ † c. 2. . . . luteum, B. 7. R. 3. L. 14.
P. 1. ♉ † c. 3. . . . afr. fol. Conjugatis & ternis, R. 4. L. 15.

LIQUIDAMBAR, Eng. *Liquid ſtorax tree.*

A. 4. b. 1. Foliis palmato angulatis, R & L. 1. M. 1.

LITHOSPERMUM, Fr. *Herbe aux perles*, Eng. *Gromil.*

P. 2. ♋ a. 1 Erectum, L. 1.

LOBELIA, *floſcardinalis dicta.*

P. 2. ♌ † b. 1. Maxima coccineo ſpicato flore, R. 1. L. 10. *Rapuntium*, M. 1.
P. 4. ♑ † b. 2. Omn. max. fl. ſpicata Coccineo, *rapuntium*, *M.* 7.
P. 2. ♌ † a. 3. Fl. dilute Cæruleo, R. 4. L. 11. *rapuntium*, *M.* 2.

LONICERA, Eng. *Honeyſuckle.* adde Caprifol. Dic. [illegible]

F. ♌ a. 1. Floribus Capitatis, androſemi folio, R. 1. L. 11.

2. Fol.

Habitus	Cultuure	
V. ♄ †	b.	2. Fol. supremis Connatis, inferioribus petiolatis, R. 2. L. 2. *periclymenum virg. fl. coccineo semper virens & florens*, B.
		3. Fructu gemino rubro, R. 10. L. 8.
		4. . . . . . nigro, L. 4. R. 7.
A. 4. ♋	a.	5. . . . . . Cæruleo, M 5.
		6. Fol. glabris Cordatis, L. 5.
		7. Fructu gemino parva nigro.

LOTUS, Fr. *Lotier*, Eng. *Birds-foot trefoil.* add. Dorycnium

P. 4. ♍	b.	1. Villosa fl. glomerato, R. 1. L. 12. M. 1.
		2. Cretica argentea fl luteo, R. 3. L. 10. M. 3.
F. ♄ †	d.	3. Fl. luteo purpurascente ex insula St. Jacobi, R. 6. L. 9 M. 5.
F. ♄	d.	4. Fruticoso Capitulis hirsutis. R. 2. L. 11.

LUNARIA, Eng. *Honesty.*

P. ½. ♌	a.	1. Siliqua globosis, R. 2 M. 7.
P. 1. ♌ †	b.	2. Leucoii fol. siligua oblonga majori, R. 4. M. 4. *Alyssum*, L. 7.

LUPINUS, Fr. *Lupin.*

P. 3. ♌	a.	1. Virginiana perennis fl. Cæruleo, L. 1. M. 7.

LUPINASTER. ~~UM.~~

P. 2. ♌	a.	1. Fl. ex albido, *trifolium*, *L.* 9.

LYCHNIS.

P. 2. ♌ †	a.	1. Quæ behen album fl. pleno, B. 29.
P. 2. ♌ †	b.	2. Ocemastrum fl albo pleno, B. 18. M. 6.
P. 3. ♌ †	a.	3. Calcedonicum fl. pleno miniato, B. 12. M. 11
P. 2. ♌ †	a.	4. Saponaria fl. pleno, B. 26. M. 12. *saponarias R.* 1.
P. 2. ♌ †	a.	5. Viscosa angusti fol. fl pleno, B. 41. L. 3.
P. 1. ♌ †	a.	6. Flore lacineato pleno, B. 47. L. 2. β.
P. 1. ♌	a.	7. . . . . . albo simplex.
P. 3. ♌ †	a.	8. Behen album similis Caule Erecto.
P. 2. ♌ †	a.	9. Ocemastrum purpurea multiplex, M. 7.

10. Caus

Habitus	Cultuure	
P. 2. ♌	a.	10. Caule ramoso, fructu globoso, *cucubalus*, *L.* 1.
P. 1. ♌ †	a.	11. Bessen album vulgo, M. 13. *cucubalus*, *L.* 2.
P. 2. ♌	a.	12. Viscosa, fl. muscoso, *cucubalus* L. 10.

LYCIUM, Eng. *Boxthorn.*

F. m.	c.	1. Fl. ex albo purpurascente, R & L. 3.
		2. . . atro purpureo, L. 1. R. 2.
		3. Fol. linearibus Latis fl. purp.
		4. . . . . tenuiore.
		5. . . lanceolatis.
		6. . . linearibus Latis fl Cæruleo amplo.
		7. . . . . Cortice albido.

LYSIMACHIA, Fr. *Corneille*, Eng. *Loose strife.*

P. 2. ♍ †	b.	1. Semper virens fol. blattariæ, B. 3.
P. 2. ♍	a.	2. Fol. quaternis fl. Luteo, L. 5.

LYTRUM.

P. 4. ♍ †	a.	1. Vulgare purpureo, R. 1.

MAGNOLIA, Fr. *Laurier Tulipier*, Eng. *Laurel-leav'd tulip tree.*

A. 2.	b.	1. Fol. ovato Lanceolato fl. ingente Candido, M. 2. L. 1. β.
		2. . . . oblongo fl. albo, M. 3. L. 1. ε.
A. 4.	b.	3. Lauri fol. subtus albicante, M. 1. L. æ.
A. 2.	b.	4. Amplissimo fl. albo fructu Coccineo, M. 4. L. 1. δ. *umbrella dicta.*

MAJORANA, Fr. *Marjoleine*, Eng. *Marjoram.*

F. ♌	d.	1. Nobilis odoratissimo, B. 1. M. 3. *origanum*, R. 4 L. 5.
P. 1. ♌	a.	2. Rotundi fol. odorato, M. 2. B. 2. *origanum* L. 1.

MALPIGHIA v. Cerasus.

MALUS VIRGINICA, Eng. *Crab tree.*

A. 3. ♃	a.	1. Fol. angulatis floribus odoratis, M. 3. ?

MAL-

Habitus	Cultuure	
		MALVA, Fr. *Mauve*, Eng. *Hollyhock.* adde Alcea. Althaea.
P. 8. ♍ †	b.	1. Rosea fl. pleno subluteo, M. 10.
P. 6. ♌ †	b.	2. Virginiana fl. amplo rubro *Lavatera species.*
P. 8. ♍ †	a.	{ 3. Rosea fl. pleno aureo.
		{ 4. . . . . . atro Rubento.
		MANDRAGORA, Eng. *Mandrake.*
P. ½. ♊	b.	1. Fructu aureo odoratissimo, R. L. & M. 1.
		MARANTHA, Eng. *Indian arrow-root.*
R. 3. ♍	g. o. x. s.	1. Cannacori folio, M. R. & L. 1.
		MARRUBIUM, Fr. *Marrube*, Eng. *Horehound.*
F. ♑	d.	1. Fruticoso fol. Cordato subrotundo, R. 2. L. 6.
F. ♍	c.	2. . . . . . rotundo Candidissimo, R. 4.
P. 3. ♍	a.	3. Album vulgare, R & L. 5.
		MARTYNIA.
R. 2. ♏ †	g. o. x. s.	1. Fol. serratis, L. 1. H. C. tab. 18.
		MARUM, Eng. *Mastich.*
F. ♋	b.	{ 1. Syriacum, M. 1. *teucrium*, *R.* 2. L. 12.
		{ 2. . . . . . foliis quasi maculato.
		{ 3. Vulgare, *Mastichina*, M. *Satureja*, *L.* 4. *Thymus*, *R.* 3.
		MATRICARIA, Eng. *Feverfew.*
P. 2. ♑ †	b.	1. Orient. fol. matricariæ Vulgaris fl. plenissimo.
		MEADIA, Eng. *American Cowslip.*
P. ½. ♉ †	a.	{ 1. Caroliniensis fl. rubro, M. *dodecatheon*, *L.*
		{ 2. . . . . . roseo, M *dodecatheon*, *L.*
		Medeola v. Asparagus
		MEDICAGO, Eng. *Moon trefoil.*
A. 4. ♑ †	g.	1. Frutescens incana, R. 6. L. 1.

L 2. Pro-

Habitus	Cultuure	
P. 2. ♄ †	c.	2. Procumbente Leguminis Cochleatis, R. 2, L. 8.
P. 4. ♄	a.	3. Caule proſtato flavo flore, R & L. 6.

MELIA v. Azedarach.

MELIANTHUS, Fr. *Meleante*, Eng. *Honey-flower.*

F. ♌ †	c.	1. Major, R L. & M. 1.
		2. Minor, R. L. & M. 2.

MELISSA, Eng. *Garden balm.*

P. 3. ♌	a.	1. Hortenſis, L. 1.
P. 1. ♌	a.	2. Pedunculus axillarlbus, L. 2.

MELOPEPO, Eng. *Squaſh.*

V.	g. o x.	1. Zeylanica ſol. hibiſci molli odorato. Cucurbita L.

MENISPERMUM, Eng. *Moonſeed.*

V. ♍	a.	1. Canadenſis umbilicato folio, L & R. 1.

MOMORDICA, Eng. *Male balſam-apple.*

V.	f. o. x.	1. Zeylanica radice perenni.

MENTHA, Eng. *Mint.*

F.	c.	1. Arborea fol. ovato Crenato, R. 8. L. 10.
P. 2. ♌	a.	2. Fol. ex argenteis varieg. M. 7.
		3. . . . aureis varieg. M. 8.
		4. . . Criſpus, L. 1.
		5. . . piperitica, L. 4. M. 2.

MERCURIALIS, Eng. *Mercury.*

F. ♄	c.	1. Fruticoſa incana teſticulata, R. 3. L. 3. M. 6.

MESEMBRYANTHEMUM v. ficoides.

MESPILUS. ad. Crataegus.

F.	c.	1. Peregrinis fol. lanceolatis.

MILIUM.

P. 2. ♌	a.	1. Floſculis Confertis, R.
P. 3. ♍	g. v. x.	2. Maxima ſemina, ex inſula St. domingo.

Mi-

Habtus	Cultuure	
		MIMULUS.
P. 2. ♋ †	b.	1. Canadensis fl. Cæruleo, L. 1.
		MIMOSA, Fr. *Sensetive.* adde Acacia
F. ♍ †	g. o. x.	1. Frutescens spinosa sensibilis, L. 14. L. 4.
		2. . . . tenui fol. sensibilis, L. 11-
F. ♍	f. o. x.	3. . . . non sensibilis, R. 12. L. 17.
		MIRABILIS v. Jalapa.
		MOLLE CLUSII.
F.	d.	1. Fol. pinnatis, B & M. *schinus*, *L.* 2.
		MOLY, Eng. *Wild garlick.*
B. 3. ♋	a.	1. Major fl. albo, M. 1. } *allium*, L. 2.
B. 3. ♋	b.	2. . . . purpureo, M. 3. } *allium*, L. 2.
B 1. ♋	a.	3. Minor fl. luteo, M. 4. *allium*, *R.* 1. *L.* 26.
		MONARDA, Eng. *Ozweega-tea.*
P. 3. ♌ †	a.	1. Fl. purpureo, R. L. & M. 1.
P. 2. ♌ †	a.	2. . . coccineo, L. 2.
P. 3. ♌	a.	3. . . albo.
P. 1. ♍ †	d.	4. . . Luteo, R & M. 2. L. 4.
		MORUS, Fr. *Meurier*, Eng. *Mulberry tree.*
F.	f.	1. Amer. spinosis, lignum sulphureo tinctorio, L. 7.
F.	b.	2. Virg. pumila fol. magis dissectis.
A. 4.	a.	3. Fructu albo, L. 1.
		MUSA, Eng. *Plantain tree.*
F. ♍ †	g. o. x.	1. Pisang maxima fructu Cucumerino, M. 1.
		2. . . . Caule maculis nigris, M. 2. *fructu odorato.*
		MYRICA, Eng. *Candleberry myrtle.* adde Gale.
F.	d.	1. Fol. subcordatis serratis, R. 4. L. 5.
F.	c.	2. . . . oblongis oppositis sinuatis, R. 3. L. 4.

Habitus Cultuure

F. c. 3. Eadem fol. hirſutis, R. 3. L. 4.

F. b. 4. Fol. lanceolatis utriumque acuminatis, L. 2. β. M. 3.
5. . . . . dentatis obtuſis, L. 3. M. 4.

F. II a. 6. . . . . fructu ſicco mas. } *L.* 1. *M.* 1. *voyez ci-devant gale No.* 2.
7. . . . . fructu ſicco fæmina.

MYRRHIS.

P. 3. ♋ a. 1. Perennis alba fol hirſuto ſem. aureo, T.

myrsine v. Vitis Idæa.

MYRTHUS, Fr. *Mirte*, Eng. *Myrtle.*

A. 4. ♍ † e. 1. Zeylanica, B 13. L. 4. *myrtoides*, R.

A. 4. ♍ † c. 2. Balſamica fol. mali granatæ, B. 3. M. 9.
3. Caule rubente odore Citri, M. 7. B. 3.
4. Latifolia romano, B. 4. L. 1. ϑ. M. 2.
5 . . . fl. pleno, B. 7. M. 6.
6. . . . bætica, B. 5. M. 10. L. 1. β.

F. e. 7. Bætica fol. parvis rotundioribus.

A. 4. ♍ †
c. 8. Buxi ampliori folio, B. 8. M. 4.
d. 9 . . . breviori folio, *bonquet mirte vulgo.*
c. 10. Minor vulgare, B. 9. M. 3. L. 1. γ. *tarentiua vulgo.*
d. 11. Eadem fol. Eleg. variegato, M. 11.
d. 12. Fol. minimus & mucronatis *rosmarini anguſti folio.*
d. 13. . . mucronatis floſculis rubris Candidis, M. 5. L. 1. δ.
d. 14. Eadem fol. ex albo Eleg. varieg. B. 12. M. 13.
d. 15. Fol. mucronatis anguſtis per intervallæ Criſtatis
c. 16. . . ampliſſimis binis vel ternis, Lauri fol. vulgo, M. 1. L. 1.
c. 17. Eadem in apice aureis notato.

A. 4. ♍ c. 18. Fol. rotundiori, *Lauri nobili fol. vulgo*, L. 1. η.

19. Fol.

Habitus	Cultuure	
A. 4. ♍ †	c.	19. Fol. acutiore reflexis, *fol. Corniculati vulgo.*
	c.	20. . . . multiflorum ex semen Lauri folio degener.
	d.	21. Bætica, fructu niveo.
		NAPÆA.
P. 2.	a.	1. Fol. profundo dissecto, L. 2.
		NARCISSUS.
B. $\frac{1}{2}$. ♈ †	a.	1. Junci fol. fl. tubam referente, R. 4. L. 3. M. 35.
B. $\frac{1}{2}$. ♈ †	a.	2. Parvus totus Luteis, B. 2. M. 5.
B. $\frac{1}{2}$. ♈ †	a.	3. Eadem quadruplo minore, *nana minima vulgo.*
B. $\frac{1}{2}$. ♈ †	b.	4. Parvus totus flavus fl. pleno, M 7.
B. 1. ♉ †	a.	5 Fl. plenissimo partim flavis partim viridibus, B. 19. M 10.
B. 1. ♈ †	a.	6. Parvus ut No. 2. sed quadruplo majoribus.
B. 1. ♉ †	b.	7. Orientalis polyanthos fl. plenissimo, albicante & luteo mixto.
B. 1. ♉ †	b.	8. . . . . . . fl. albicante & luteo mixto Calice pleno major.
B. 1. ♉ †	b.	9. . . . . . . eadem minor.
B. 1. ♈ †	d.*	10. Constantinopolitanis fl. pleno, M. 37.
B. 1. ♉ †	b.	11. Orientalis polyanthos, *Narcisse abouquets, tacettes*, ou Trosnarcisse. Dont on on trouve chez nous un assortument de plus que 100 Especes tant soit peu differente, d'une beauté acheve, etant Leur noms & Couleurs annuellement specifié aux Catalogue des oigons.

NERIUM, Fr. *Laurier rose*, Eng. *Oleander-or rose bay.*

A. 4. ♌ †	e.	1. Flore rubro, M. 1. L. 1. B. 1.
		2. . . . albo, M. 2. B. 2.
A. 4. ♌	e.	3. . . carnæo odorato, M. 3. B. 3.
		4. . . varieg. odorato pleno, M. 4. & 5. B. 4 & 7.
		5. . . . . . . fol. ex aureo Eleg. varieg.

Habitus	Cultuure	
F. ♄ †	f. *o. x.*	6. Fol. oblongis fl. pulchro purpureo, *vinca arborea.*
		NICOTIANA, Fr. *Tabac*, Eng. *Tabacco.*
F. ♄ †	c.	1. Fruticoſo perennis anguſti folio, M. 3.
P. 2. ♄ †	d.	2. Humilis perennis, latiori & oblongiori folio.
		Nyctanthes v. Jasminum. 11. NYSSA, Eng. *Tupele tree.*
F.	b.	1. Pedunculis multifloris, M. 1. L. 1.
		OCYMUM, Fr. *Baſilic*, Eng. *Baſil.*
F. ♍	e. *o.*	1. Zeylanicum perennis fruteſcens, M. 17. R. 3. L. 1.
		OMPHALOIDES, Eng. *Navel-wort.*
P. ½. ♄ †	a.	1. Pumila verna ſymphiti folio, M. 3. *Cynogloſſum*, R. 4. L. 6.
		OENANTHE, Eng. *Drop-wort.*
P. 2. ♋ †	a.	1. Floſculus radiantibus umbellarim proliferis, R. 4. L. 3.
		OENOTHERA, Eng. *tree Primroose.*
P. ½. ♋ †	a.	1. Humillima fl. aureo.
		OLEA, Fr. *Olivier*, Eng. *Olive.* add. Crassus
A. 4. ♋	c.	1. Sativa, M. 1. L. 1. 2. Fol. duro ſubtus incanis, R. 1. M. 2. 3. . . buxi Craſſo atro viridis lucido, R. 2. L. 1. β. M. 3. 4. . . longo lato, B. 4. 5. . . . anguſto, B. 5.
		ONONIS, Fr. *Arrete beuf*, Eng. *Reſt harrow.*
P. 3. ♌	a.	1. Spinoſa fl. purpureo, R. 1. L. 1. *anonis*, *M.* 1. 2. Spinis Carens Candidis floribus, *anonis*, *B.* 3. *M.* 4.

3. Fru-

Habitus	Cultuure	
F. ♌ †	a.	3. Fruteſcens fl. rubro amplo, R. 7. L. 11. *ano-nis*, *B.* 8
P. 2. ♅ †	b.	4. Lutea ad florum petiolos Capreolata, L. 7. γ. M. 16.
F.	c.	5. Afr. fruticoſo fl. purpureo *Pſoralea*, *L.* 1.
F. ♍ †	d.	6. . . pumila fruticoſo fl. pulchro purp. globoſo *Pſoralea*, *L.* 1.

OPHIOGLOSSUM, Fr. *Langue de ſerpent*, Eng. *Adders tongue.*

R. ½. ♉	a.	1. Fol. ovato ſpica diſticha, L 1.

OPHRIS, Fr. *Double feuille*, Eng. *Tway blade.*

R. ½. ♉	a.	1. Bifolia, R. 1. L. 5. M. 1.

OPULUS, Fr. *Obier*, Eng. *Gelder-roſe.*

A. 4. ♊ †	a.	1. Fruteſcens fl. ſimplici, M. 1. R. 1. *viburnum*, L. 7. æ.
		2. . . . globoſo, M. 2. *viburnum*, L. 7. β.
		3. . . . . . . fol. varieg. M. 3.

OPUNTIA, Fr. *Raquette*, Eng. *Indian fig.*

F. ♍ †	e. ſ.	1. Curaſavica minima, M. 9. cactus, R. 13. L. 19.
F. ♍ †	e. ſ.	2. Flagelli formi anguſtiſſimo & longiſſimo folio ſpinoſiſſimo, B. 9 M. 7.
F. ♍ †	d. ſ.	3. Maxima fol ſpinoſo latiſſ. & longiſſimo, M. 6 B 1. *Cactus*, *R.* 14 L 17.
		4. Eadem omnium maximum.
		5. Fol. longiſſimo ſubinermibus *Cactus*, *L.* 18.
		6. Latefolio ſpinis albis numeroſis, M. 8. *Cactus*, *L* 16.
P. 1. ♍ †	c.	7. Fol. minore rotundiore & Compreſſiore, M. 4.
P. ½.	d.	8. Omnium minimum, M. 2.

OR-

Habitus	Cultuure	
		ORCHIS, Eng. *Satyrion, or fool-stones.*
B. 1. ♊ †	b.	1. Testicula, fl. fucum Referens, M. 13.
		2. Palmatis fol. maculato fl. ex roseo varieg.
B. 1. ♊ †	a.	3. . . . angusto non maculato fl. purpureo
		4. . . . Maculato fl. rubro varieg.
		5. Testiculata, fl. purpureo.
		6. . . . . albo.
B. ½. ♊ †	a.	7. . . . . viridi Labiato.
		8. . . . . rubro Capitato.
		9. Palmatis fol. lato non maculato fl. purp.
B. 1. ♊ †	a.	10. . . . angusti fol. non maculato fl. roseo.
		11. . . . maculato fl. purp. varieg.
		ORIGANUM v. Dictamnus. Majorana.
		ORNITHOGALUM, Eng. *Star of bethlehem.*
B. ½.	c.	1. Fol. Cordato ovatis, R. 1. L. 11.
		2. Latifolium maximum, B 3. L. 6.
		3. Exoticum magno fl. minori innato, B. 11.
B. 3. ♊	b.	4. Angusti fol fl. ex albo virescente, B 4. M. 1. L. 5.
		5. Spicatum fl. viridi lactescente, B. 5.
B. 2. ♋ †	d.*	6. Afr. fl. albo amplissimo.
B. ½. ♊ †	b.	7. Humilis fl. Cæruleo odorato, M. 14.
B. 2. ♊	a.	8. Neapolitanis, M. 7.
		OROBUS, Fr. *Orobe*, Eng *Bitter vetch.*
P. 2. ♋ †	a.	1. Caule ramoso fl. purpurascentibus, R. 1. L. 7. M. 4.
P. 1. ♈ †	a.	2. Purpureis sylvaticus vernus, M. 1. B. 1.
P. 1. ♈ †	a.	3. Sylvaticus vernus fl. albicante, B. 8.
P. 1. ♋ †	a.	4. Latifolio repens fl. purpureo, B. 6. M. 5.
		OSMUMDA, Fr. *Osmonde*, Eng. *Flowering fern.*
P. 3. ♋	a.	1. Sive filix florida, R 3. L. 13.
P. 1. ♋	b.	2. Frondibus duabis decompositis, R. 2.
P. 1. ♋	a.	3. . . . pinnatis, R. 4. L. 13. *polypodium sensibilis*, B. 3.

Habitus	Cultuure	
		O S T E O S P E R M O S.
F. ♄ †	d.	1. Africanum odor. ſpinoſum & viſcoſum, R. 1. L. 2. M. 4.
F. ♄ †	d.	2. . . . . viſcoſum non ſpinoſum.
F. ♍ †	c.	3. Fol. populi albæ, R. 2. L. 3. M. 2.
F. ♄	c.	4. . . lanceolato dentato, L. 4. M. 3.
F. ♍	c.	5. . . palmatis, L & M. 1.
		O T H O N N A, Eng. *African Ragwort,*
F. ♌ †	d.	1. Fol. pinnatifidis fl. aureo, R. 3. L. 10. M. 3.
		Oxalis v. O X Y S, Eng. *Wood-ſerrel.*
B. ½. ♄	c.*	1. Bulboſa Ethiopica fl. ex albo purpuraſcente, M. 6. *oxalis*, *L*. 5. *R*. 3.
B. ½. ♉ †	c.*	2. . . . afr. fl. purp. amplo, *oxalis*, *R & L*. 2.
B. ½. ♄ †	c.*	3. . . . . luteo Copioſo, B. D tab. 29.
B. ♊ †	c.*	4. . . . . . Elegantiſſimo pleno.
		P A D U S, Eng. *Bird Cherry.*
A. 3. ♊ †	a.	1. Glandula duabus baſi foliorum ſubjectus, R. 1. M. 1. *Prunus*, *L*. 1. *Ceraſus avium dicta*.
A. 4.	a.	2. Virgin. fol. deciduis lanceolatis, M. 3.
		P Æ O N I A, Fr. *Pivoine.*
P. 2. ♊ †	a.	1. Flore pleno rubro majore, M. 4. 2. . . . albo major, M. 6. 3. . . . roſeo major. 4. . . . purpureo tenui fol. B. 12. 5. Fl. purpureo *Coral pæony vulgo*. 6. Fol. tenuiſſimo fl. rubro ſimplex.
		P A L M A, Eng. *Date-tree.*
P.	f.	1. Japonica, polypodi fol. M. 9. *Cycas*, *R & L*. 1.
A. 4. ♌	d.	2. Humilus pedunculo ſpinoſo, M. 2. *Chamærops*, *R & L*. 1.

M 3. Zey-

Habitus	Cultuure	
P.	f.	3 Zeylanica non ſpinoſa, *Chamærops*, *R. 2.*
A. 3.	d.	{ 4. Dactylifera vera mas *phœnix*, R & L. 1
		{ 5. . . . . . fœmina *phœnix*, R & L. 1.

PANCRETIUM, Eng. *Sea daffodil.*

B. 2. ♋ †	b.	1. Fol. enſiformi fl. albo odorato, M. 3. R. 2. L. 6.
B. 1. ♋ †	f. *o. x.*	2. Am. fol. latiſſimo, floribus niveis majoribus odoræ balſami peruvianis, M. 5.

PAPAVER, Fr. *Pavot*, Eng. *Poppy.*

P. 2. ♉	a.	1. Erratticum flavo flore, M. 18. L. 7.
P. 2. ♋ †	a.	{ 2. Orient. hirſutim fl. magno auranteo, L. 8. M. 9.
		{ 3. Eadem fl. maculis nigris notatæ.

PARKINSONIA.

F.	f. *o. x.*	1. Aculeata, H. C. tab. 13. L. 1.

PARNASSIA, Eng. *Grafs of parnaſſus.*

P. ½. ♊ †	a.	1. Fl. albo, L. 1. M. 1.

PARTHENIUM, Eng. *Baſtard feverfew.*

F.	b.	1. Peruvianum arboreum, M. 3. *iva*, *L. 2.*
P. 2. ♌ †	a.	2. Fol. ovatis Crenatis fl. albo, *vel beleni folio*, M. 2. L. 2.

PASSERINA, Eng. *Sparrow wort.*

E. ♌	c.	1. Fol. linearibus, R. L. & M. 1.

PASSIFLORA, Granadilla

PAULINIA.

F. ♍	b.	1. Foliis pinnatis foliolis inciſis, R. 1. L. 7.

PAVIA, Eng. *Scarlet Horſe Cheſtnut.*

A. 3. ♊ †	a.	1. Virginiana, R 1. B. 1. M. 1. æſculus, L. 2.

PENTAPETES.

F. ♉ †	f. *o. x.*	1. Fol. haſtato, L. 1. *blattaria Zeylanica fl. amplo Coccineo.*

Habitus Cultuure

PENTAPHYLLOIDES, Eng. *Cinquefoil.*

F. ♄ † a. 1. Fruticosum, B. 4. *potentilla*, R. 1. M. 3. L. 1.

PERESCIA, Eng. *Gooseberry.*

F. e. *o. s.* 1 Aculeata fl. albo, R & M. 1. *Cactus*, L. 21.

PERIPLOCA, Eng. *Virginian silk.* adde Apocynum 9.

V. ♍ † a. 1. Monspeliaca fol. acutioribus, B. 3. M. 1. *Cynanchum*, R. 2.

PERVINCA, Fr. *Pervence*, Eng. *Periwinkle.*

P. ½. ♉ a. { 1. Fol. ex aureo varieg. M. 6.
2. . . . arg. varieg. M. 7.
3. Fl. pleno saturate purpureo, M. 5. }

P. ♃. ♉ a. 4. Latifolio fl. Cæruleo, M. 3. *vinca*, L. 2.

PERSICARIA, Fr. *Persicaire*, Eng. *Arse smart.*

P. ♋ a. 1. Virg. fl. albo, R. 3. *polygonum*, L. 5.

PETIVERIA, Eng. *Guiney henweed.*

F. ♄ e. { 1. Solani folio, R. L. & M. 1.
2. . . . . Eleg. varieg. }

PEUCEDANUM, Eng. *Hogs fenel.*

P. ♃. ♌ a. 1. Fol. linearibus ramosis, R. 3. L. 2.

PHALANGIUM.

P. ½. ♄ c.* { 1. Foliis linearibus fl. albo
2. Afr. fol. linearibus Carnosis fl. albicante } ad anthericum, L.

PHASEOLOIDES, Eng. *Carolina kid'ney bean tree.*

V. ♌ † b. 1. Caroliniensis fruticosa *glycine*, M. 2. L. 3.

PHALARIS v. Gram

PHILADELPHUS, Eng. *Mock' orange.*

A. 4. ♋ † a. 1. Fol. subdentatis, R & L. 1. *syringa alba*, M. 1.

Habitus Cultuure

PHILYREA, Fr. *Filaria*, Eng. *Mock privet.*

A.4.♉ a. 1. Craſſo latiſſimo atroviridis fol. quaſi ilicis, L. 2. M. 2.
A.4.♉ b. 2 Fol. ovato Lanceolatis vix Crenatis, R & L. 1 æ.
F.♉ b. { 3. Latifolia Lævis, M. 1. L. 1. β.
4. Folio alterni, M. 3.
5. Anguſti fol. ſecunda, M. 6.
6. Olæa epheſiacæ fol. M. 7. }

PHLOMIS, Eng. *Sage-tree.* add. Leonurus.

F.♋† b. { 1. Fruticoſa fol. ſalvia latiore, M. 3.
2. . . . . . longiore, M. 2.
3. . . . . ſubrotundo breviore, M. 1. L. 1. β. }
P.5.♋† a. 4. Narbonenſis fl. purpuraſcente, M. 4. L. 7.
F.♋† b. { 5. Fruticoſo fl. purpureo, M. 10.
6. . . . . purpuraſcente, M. 11. L. 2. }

PHOENIX v. Palma.

PHLOX, Eng. *Lychnidea.*

P.2.♌† a. 1. Fol. lineari Lanceoltis fl. pulchro purp. R & M. 1.
P.½.♊† a. 2. . . ovato lanceolato Caule reclinato fl. rubello, M 3. L. 3.
P.4.♍† a. 3. . . lanceolatis linearibus Caule Elatior fl. purpureo, M. 4.
P.2.♌† a. 4. . . lucidis acutis fl. rubro quaſi umbellato, M. 2.
P.2.♍† a. 5. . . lanceolatis hirſutis fl. rubro.

PHYSALIS v. Alkekengi.

PHYLICA v. alaternoides.

PHYTOLACCA, Eng. *American Nightſhade.*

R.8.♌ ↔ a. 1. Americana majori fructu, R. L. & M. 1.
F.♎† e. 2. . . . fructu minore, B. 2. *Rivinia*, R. 1. L. 1. æ.
F.♎† e. { 3. Mexic. baccis ſeſſilibus fl albo, M 2. L. 1. β.
4. . . . . . . rubello, M. 2. L. 1. β. }

PI-

Habitus	Cultuure	
		PIMPINELLA, Fr. *Pimprenelle*, Eng. *Burnet.*
F. ♄	d.	1. Spinosa semper virens, B. 7. *poterium*, L & R. 3.
P. 2. ♌ †	a.	2. Maxima Canadensis, B. 1. *sanguisorba*, R & L. 2. M. 3.
		PINUS, Fr. *Pin*, Eng. *Pine tree.* adde Abies. Larix
A. 2.	a.	1. Sativus fol. quinis nucleo eduli, L. 4. *Cembra dicta.*
A. 1.	a.	2. Silvestris, L. 1. M. 2.
A. 3.	c.	3. Hierosolymytana prælongis tenuiss. viridibus setis, M. 15. *fol. binis.*
A. 3.	a.	4. Amer. longiss. & viridibus setis. M. 19. *fol. binis.*
A. 3.	a.	5. Virg fol. binis brevioribus & Crassioribus setis, M. 18
A. 3.	a.	6. Fol. brevibus glaucis Conis parvis albentibus, M. 3.
A. 2.	a.	7 Am. fol. prælongis Conis plurimis Confertim nascentibus, M. 4.
A. 2.	a.	8. . . ex uno folliculo setis longis tenuibus triquetris, M. 5. *Weymouth pin vulgo.*
A. 2.	a.	9. Sybyriensis.
A. 3.	a.	10. Virg. foliis tenuioribus Conis echinato, M 16.
A. 1.	a.	11. . . tripilis plerumque ex uno folliculo setis strobilus majoribus, M. 17.
		PIPER.
P. 1.	f. o. x.	1. Fol. obverse ovatis Caule procumbente; L. 11.
F. ♍ †	f. o. x.	2. Frutescens fol septinerviis oblongo acuminatis, L. 2. tab. 83. fig. 2. T. 2.
		PISONIA, Eng. *Fingrigo.*
F.	e o.	1. Aculeata, L. 1.
		PISTACHIA; Fr. *Terebinte*, Eng. *Turpentini tree.* add. Lentisca
A. 4.	e.	1. Indica theophrasti, M. 2. L. 3.

Habitus Cultuure

PITTONIA.

A. 4. ♍ † e. 1. Racemosa fol. ovato Lanceolato, M. 7. *tournefortia*, R. 1. L. 4.

PLANTAGO, Fr. *Plantain.*

P. 1. ♉ † a. 1. Tattarica spica longo roseo Colorae.

PLUMBAGO, Eng. *Leadwort.*

F. e. 1. Zeylanica fl. lacteo, L. 2. R. 2.

POINCIANA, Fr. *Poincillade*, Eng. *Flower fence.*

F. ♍ † g. o. x. { 1. Fol. duplicato pinnato fl. luteo, M. 1. R & L. 1.
2. Eadem fl. ex rubro luteo Eleg varieg. R & L. 1. }

POLEMONIUM, Eng *Greek valerian.*

P. 2. ♌ † a. { 1. Flore Cæruleo fol. varieg. M. 4.
2. . . albo, M. 2. L. 1.
3. . . Cæruleo, M & L. 1. }

POLYANTHOS, Fr. & Eng *Tubereuse*

P. 3. ♏ † c.* 1. Fl. umbellato Cæruleo, M. 3. *Crinum*, *L* 4.

B. 3. ♍ † e. x. ∬. { 1. Floribus alternis simplici, M. 1. L. 1.
2. Eadem fol. ex aureis Eleg. striato.
3. Floribus alternis fl pleno, M. 2. } tuberose vulgo.

POLIUM, Eng. *Poley mountain.*

P. ½. ♋ † a. 1. Pyrenaïcum hederæ terrestri fol. R. 5. M. 5. *teucrium*, R. 5. 23.

P. ½. ♋ b. { 2. Montan. album supinum Capitulis multis globosis, B. 8. *teucrium*, *L*. 25.
3. . . . luteum serratis angustioribus incanis fol. B. 7. *teucrium*, *L*. 24. }

Polygonum adde Bistorta - Guajabara.
Fagopyrum, Persicaria.

Habitus Cultuure

POLYPODIUM, Fr. *Polipode*, Eng. *Polipody.*

P. 2. ♋ c. o. 1. Amer. magis diffectis Caule & Costa villosis, L. 54.

P. 1. ♌ c. 2. Fronde duplicato pinnato, R 5. L. 38.
3. . . . alternatim duplicato pinnato, R. 7.
4. . . . duplicato dorso bulbiferi, R. 9. L. 43.
5. . . . alternatim supra decomposito, R. 10. L. 58.
6. . . . pinnatis foliolis lanceolatis, R. 11. L. 13.

POPULAGO, Eng. *Marsh marigold.*

P. 1. ♉ † a. 1. Major, M. 1. *Caltha*, L. 1.
2. Flore pleno, M. 3. *Caltha*, L. 1. *γ*.

POPULUS, Fr. *Peuplier*, Eng. *Poplar.*

A. 4. ♋ a. 1. Recinosa, B. 5 *R & L.* 4. *tacamabaca theophrasti, tacamabaca, M.*

A. 1. ♋ a. 2. Alba fol. variegato, M 5.

A. 1. ♋ a. 3. Caroliniensis fol. ampliss. Caule Caniculato, L. 5. *balsamum odoratiss. fundentibus*, M. 6.

portulacca

~~POTENTILLA~~, Fr. *Pourpier*, Eng. *Purslane.*

F. e. o. s. 1. Fruticoso semper virens fl. rubicundo, L. 3. *anacampseros*, R. 1.

P. ½. ♍ † e. o. s. 2. Fol. ovatis petiolatis fl. muscoso, Capsula bifurea, R. 2.
3. Lanuginosa procumbens fl. dilutius rubento, L. 2. æ. R. 3.

POTENTILLA, Fr. *Quinte feuille*, Eng. *Cinquefoil.* add. Pentaphylloides.

P. 2. ♌ † a. 1. Rectum luteum, L. 18.
2. . . . floribus subluteis, R. 6. L. 10.

P. ½. ♉ a. 3. Album majus alterum, R. 8. L. 16.

PRASIUM, Eng. *Hedge nettle.*

F. ♄ c. 1. Fol. ovatis fl. magno Candida tantilla purp. varie notato, R. L. & M. 2.

PRI-

Haibtus Cultuure

PRIMULA VERIS, Fr. *Prime vere*, Eng. *Primrose or polyauthus.* adde Auricula Urs.

P. $\frac{1}{2}$. ♉ † b.	1. Fl. pleno pallide luteo, M. 9. 2. . . . . roseo, M. 8. 3. . . . . coccineo.
P. $\frac{1}{2}$. ♉ a.	4. . . luteo duplici umbellato, *herba paralysis vulgo.* 5. . . umbellato flores foliisque.
P. $\frac{1}{2}$. ♉ † b.	6. Fol. Cunei formibus, L. 4.

Et d'ailleurs un assortiment de plus que 100 Especes, extremement belles, peintes en toutes sortes des Couleurs, dont on trouve les noms, couleurs & prix dans une Catalogue separate.

PRINOS, Eng. *Winter berry.*

F. ♋ a. 1. Fol. longitudineter serrato, L. 1. M. 1.

PROTEA v. Conocarpod.

PRUNUS, Fr. *Prunier*, Eng. *Plum.* add. Cerasus. Prunus. Padus.

A. 4. ♊ a.
1. Virginiana.
2. Flore pleno fructu amplo suaviss. Carnæ Coloris.

PSEUDO-ACACIA.

A. 2. ♋ † a. 1. Vulgaris, B. 1. *Robinia*, L. 1.

PSORALEA v. Barba Jovis. 2. Ononis.

PTELEA, Eng. *Carolina schrul trefoil.*

F. ♋ † a. 1. Virginiana fol. ternatis, L. 1.

F. ♍ c. 2. Africana salicis fol. L. 2. *dodonea*, *R.* 1.

PROTEA v. Argyrodendram.

PULMONARIA, Fr. *Pulmonaire*, Eng. *Lung wort.* add. Cerinthe.

A. $\frac{1}{2}$. ♈ a. 1. Alpina maculosa, B. 2. L. 2. æ.

PULSATILLA, Fr. *Coquelourde*, Eng. *Pasque flower.*

A. $\frac{1}{2}$. ♉ b. 1. Fl. pendulo limbo reflexo, R. 2. *anemone*, *L.* 6.

Pu-

Habitus	Cultuure	
		PUNICA, Fr. *Grenadier*, Eng. *Pom granate.*
A. 4. ♍ †	c.	1. Fl. ſimplici, B. 1. M. 1. L. 1. æ.
		2. . . pleno majore, B. 2. M. 4. L. 1. β. *Calice Longo.*
F. ♍ †	d.	3. American. pumila, M. 5. *fl. ſimplici.*
A. 4. ♍ †	c.	4. . . . . fructu maximo.
		5. Fl. pleno majore *ſine Calice.*
		6. . . . . *Calice brevi.*
		7. . . . . minore *Calice Longo.* Psidium v. Guajava
		PYROLA, Fr. *Pyrole*, Eng. *Winter green.*
P. ½. ♊	a.	1. Piſtillo declinato, L. 1.
		QUERCUS. add. Ilex. Suber.
A. 2.	a.	1. Fol. Eleg. varieg. M. 3.
A. 4.	a.	2. Pumila virg. Caſtanea fol. M. 27.
A. 2.	a.	3. Fol. amplioribus aculeatis, M. 33. L. 9. æ.
		4. Calice echinato glande majore, M. 5 L. 13.
		5. . . . . . minore, M. 8. L. 14.
		6. Pediculis longiſſimus, M. 16. L. 12.
		7 Mariana glande parva Compreſſa.
		8 Hiſpanica
		9. Nigra virginiana, L. 8.
		10. Rubra virginiana.
A. 4.	a.	11. Virg. ſalicis longiori folio, M. 26. L. 1. γ.
A. 3.	a.	12. . . pubeſcentibus fol. Eleg. diſſecto M 11.
A. 4.	a.	13. Humilus gallis binis, ternis, aut pluribus ſimul junctis, M. 6.
A. 3.	a.	14. Caſtanea fol. procera arbor virginiana, M. 24. L. 7.
A. 3.	a.	15. Marylandica fol. trifido ad ſaſſafras accedente, M. 29. L. 8. γ.
		RANDIA.
F. ♍	e. o.	1. Fruticoſo fol. ſubrotundo fl. albo, L. 1.
		RANUNCULUS, Fr. *Renonculen*, Eng. *Crowfoot.*
P. ½. ♊ †	a.	1. Fol. plantaginis, B. 66. R 4. L 7.
P. 2. ♂ †	a.	2. Hortenſis erectis fl. luteo pleno, L. 28. β. M. 1.

Habitus	Cultuure	
P. 1 ♊ †	a.	3. Fol. aconiti fl. albo pleno, L. 16. M. 4.
P. 2. ♊ †	a.	4. Bulbofis fl. pleno Luteo, B. 14. M. 5.
P. ½. ♈ †	a.	5. Rutacei fol. fl. pleno luteo, B. 29.
P. 2. ♊	a.	6. Montanis latiff. fol. hirfuto.
P. 1. ♊	a.	7. Seminibus aculeatis, R 14. L. 32.
P. ½. ♊	a.	8. Fol. integerrima lanceolatis fl. aureo amplo, L. 3. M. 18.
P. ½. ♊	a.	9. Graminea fol. repente, R. 2. L. 1. β.
R 1. ♈ ♊ & ♋ †	b.	10. Ranunculus afiaticus five perficus. Dont on trouve chez nous une Collection de mille efpeces d'une beauté achevée en toute fortes des Couleurs. On en trouve annuellement les noms, couleurs & prix fpecifiée dans le Catalogue des oignons.

RAPUNCULUS, Fr. *Raiponte*, Eng. *Thorat Wort.*

P. 1. ♉ †	d.	1. Valerianelloides Cæruleis umbellatis, B. *trachelium*, *R & L.* 1. *M.* 1.

Rheum v. RHABARBARUM, Eng. *Monks rabarb.*

P. 3. ♋	a.	1. Fol. lobatis, *Rheum*, *L.* 2. *Lapathum*, *B & M.*

RHAMNUS, Fr. *Nerprun*, Eng. *Buckthorn.* add alaternus Frangula

A. 3. ♋	a.	1. Catharticus, B & M. 1. R. 7. L. 1.
F. ♌ †	b.	2. Aculeis geminatis, R. 1. L. 5. *paliurus, porte Chapeau dicta.*
A. 4. ♌	c.	3. Afer. fol. pruni fl. Candicanto fpinis foliofis, B. M. 6. *Celaſtrus*, *R.* 2. *L* 4.
F. ♍	c.	4. Seu jujuba amer. fpinofa, R. 3. L. 11.
F. ♌	c.	5. Inermis fol. ovatis integerrimus glabris, R. 6. L. 3. β.
F.	c.	6. . . . . africanis humilis fol. buxi breviore.
F.	c.	7. Zeylanica fpinofa fol. oblongo ferrato.
F. ♉ †	c.	8. Afer. fpinofa fructu triloculari.

Rhodiola v. Anacampseros. RHUS, Fr. *Sumac*, Eng. *Sumach.* add. Cotinus.

A. 4. ♋	a.	1. Fol. pinnatis ferratis, B. R. & L. 1.

2. Fol.

Habitus	Cultuure	
A. 4. ♋	a.	2. Fol. pinnatis fructu thomboidea, R. 2. L. 4.
A. 4. ♋	b.	3. . . ternatis glabris, R. 4. L. 6.
		4. . . . . . . minor Caule volubili, L. 6. γ.
A. 4. ♋ †	a.	5. . . pinnatis glabris, panicula Eleg. coccineis, L. 3.
A. 4.	c.	6. Afr. trifoliat. minus glabrum ſplendente fol. R. 7 L. 11.
A. 4.	c.	7. . . trifoliatum majus glabrum, ſubrotundo medio quandoque Crenato, B. 12.
F. ♋	c.	8. . . trifoliato anguſto glabro.
		9. . . . . . glabro anguſtiſſimo.
A. 4.	c.	10. . . . . . oblongo obtuſo.
A. 3.	a.	11. Canadenſis altiſſ. *arbor vernicifera ſpuria vulgo.*
F.	c.	12. Afr. trifol. integro ſubrotundo molli & incano, M. 8.
		13. . . . . majus pubeſcentibus fol. dentato, L. 8.
		14. Javanica fol. pinnatis ſerratis, L. 2.

RIBES, Fr. *Groſelier*, Eng. *Curran tree.* adde Groenlandica

F. ♊	a.	1. Alpinum dulce, R. 3. L. 2. M. 6.
		2. Fructu rubro fol. Eleg. varieg. M. 2.
		3. . . . nigro fol. varieg. M. 13.
		4. Virginiana nigro fl. oblongo, L. 3. β. M. 14.

RICINUS, Fr. *Ricin*, Eng. *Oil-ſeeds.*

F. ♌	e.	1. Perennis, B. 4.

ROBINIA v. Caragana v. Pseudoacacia
RIVINIA v. Phytolacca

ROSA, Fr. *Roſier*, Eng. *Roſe tree.*

F. ♋ †	a.	1. Carnæo fl. pleno, B. 17.
		2. Humillima fl. pleno parvo ſuave rubento,
		3. Pedunculo muſcoſo, B. 12. M. 16.
		4. Spinoſſimo pimpinella glabre fol. fl. pleno livide rubento.
		5. Rubra pallidiore fl. pleno, T.
		6. Fl. pleno pallido ampliſſimo.

Habitus **Cultuure**

7. Fl. Carnæo pleno.
8. . . pallido ſuaviter Rubento pleno.
9. . . . . . rubello pleno ſpinis Carens.
10. . . pnlchro purp. pleno per intervallæ flos ex flore.
11. Lutea multiplex, B. 4. M. 23.
12. Fl. pleno ex rubro roſeo.
13. . . . . . odore Cinnamomi, T. M. 20.
14. . . . . . ſuave rubento.
15. . . . . . ex purpuro rubello.
16. . . . . . amplo purpureo.
17. . . . . . albicante.
F. ♋ † a. 18. . . . . . purpureo.
19. . . . . . ex rubro purpureo.
22. . . pleniſſimo pallido.
21. . . pleno purpuraſcente.
22. Omnium Calendarum fl. pleno carnæo, T. M. 35.
23. Lutea ſimplex, B. 1. M. 22.
24. Fl pleno quaſi umbellato lividi rubello.
25. Præneſtina fl. varieg. pleno, B. 24. M. 31.
26. Regina dicta per intervallæ flos ex floræ.
27. Anglicæ fl. pleno variegato, T. M. 32.

F. ♎ † b. 28. Muſchata fl. albo pleno, B. 16.

29. Fl. pleno Carnæo in medio rubento, B. 8.
30. Pomifera major, T.
31. Fl. pleno ex rubro nigricante, T.
32. . . rubello pleno, B. 12.
33. Eglanteria ſpinoſſimo fl. albo ſimplex.
34. Saturateis rubens T. *fl. pleno kermoſino.*
35. Multiplex media T. *pleno flore.*
36. Fl. pleno amplo ruberrimo, B. 29.
F. ♋ † a. 37. Eglanteria fol. pimpinella glabro fl. rubro parvo pleno.
38. Semper virens, M. 34.
39. Fl. pleno ſaturatus purpureis.
40. . . . . . rubens altera.
41. . . . . albo, T. B. 10.
42. Vix ſpinoſa fructu globoſo.
43. Virg. vel ſchotica fl. ex purpureo & rubro Eleg. maculato, M. 6.

F. ♍ a. 44. Virgin. autumnales flore rubro ſimplex odore ſuaviſſimo.

Habitus	Cultuure	
		45. Fl. atro purpureo duplex, M. 18.
		46. Silvestris fol. odoratis, M. 7.
		47. . . . . . fl. pleno, M. 9.
		48. Simplex fl. nutante, L. 11.
F. ♋ †	a.	49. . . . . intus Coccineis extus luteis.
		50. Provintialis fl. rubro pleno, M. 17.
		51. Fl. pleno suaviter rubello.
		52. . . pleniſſimo purpuraſcente.
		53. . . incarnato, M. 30.
		54. Sine ſpinis fl. minore, M. 37.

ROSMARINUS, Fr. *Romarin.*

F. ♊	b.	1. Fol. ex albo Eleg. varieg. B. 4. M. 6.
		2. . . . aureis ſtriatis, B. 2. M. 3.

ROYENA, Eng. *African bladder nut.*

A. 4. ♈	c.	1. Fol. ſingulari lucido, L. R. & M. 1.
F. ♈	c.	2. . . lanceolatis ſive myrti anguſti fol. L. R. & M. 2.
		3. . . . . . hirſutis, L. R. & M. 3.

RUBIA, Fr. *Garance*, Eng. *Dyers madder.*

P. 2. ♊ †	a.	1. Folio quaternis glabrus, R. 4.
P. 4. ♊	a.	2. Tinctorum ſativa, M. 1. L. 1. β.

RUBUS, Fr. *Ronce*, Eng. *Bramble.*

F. ♉ †	a.	1. Odoratus dictus fl. Eleg. purpureo, M. 10. R 1. L. 7.
V. ♌ †	a.	2. Fl. albo pleno, B. 6. M. 15.
V. ♌	a.	3. Major fol. variegato, M. 4.

RUDBEKKIA, Eng. *Dwarf ſun flower.*

P. 2. ♉ †	b.	1. Integri fol. radio aureo umbone atro rubento, L. 3. M. 1.
P. 3. ♌ ♍	b.	2. Fol. oppoſitis lanceolatis petalis radii bifidis, L. 5. M. 6.
P. 8. ♌ ♍	a.	3. Fol Compoſitis lancineatis fl. aureo, L. 1. M. 3.
		4. . . . . lacin. anguſtioribus fl. luteo, M. 4.

Habitus	Cultuure	
		RUELLIA.
P. 1. ♄ †	c.	1. Americana fl. Cæruleo.
P. 1. ♌	c.	2. Pedunculus multifloris.
F. ♄	c.	3. Fruticoſo.
		RUSCUS.
P. 1. ♊	a.	1. Myrti fol. aculeato, R. L. & M. 1.
P. ½. ♊	b.	2. Latifolio fructu fol. inſidente, L. 2.
P. ½. ♊	b.	3. Anguſti fol. fructi fol. inaſcente, L. 3.
P. 2. ♊	b.	4. . . . . Racemoſo, L. 5.
		RUTA, Fr. *Ruë*, Eng. *Rue*.
F. ♄ †	c.	1. Chalapenſis latifolius florum petalis villis ſcatentibus, M. 4. B. 5. L. 1. ♂.
		2. . . . . . tenui fol. fl. petalis villis ſchatentibus, M. 5. B. 4. L. 1. ♀.
F. ♄	a.	3. Hortenſis minor fol. ex albo varieg. M. 3.
		SABINA, Eng. *Savine*.
F.	a.	1. Tamariſci fol. M. 1. *Juniperis*, L. 6.
		2. Fol. Eleg. variegatis, M. 3.

Saccharum v. Arundo 1.

Habitus	Cultuure	
		SALICORNIA, Eng. *Glaſſwort, or ſaltwort.*
F.	d.	1. Arabica articulis obtuſis, L. 2.
F.	a.	2. Geniculata ſemper virens, L. 1. ♂. M. 1.
		SALIX, Fr. *Saule*, Eng. *Willow*.
A. 3. ♉ †	a.	1. Fol. laurinis, utriumque virente odorato, R. 2. M. 3.
A. 4. ♉	a.	2. . . Elegantiſſ. varieg. M. 9.
A. 3. ♉	a.	3. Babylonica ramis pendulis, M. 11. L. 9. R. 10.
F. ♉	a.	4. Fol. buxi majore fl. purpureo.
		SALVIA, Fr. *Sauge*, Eng. *Sage*.
F. ♄	c.	1. Fol. haſtata triangularo, R. 3. L. 20.
P. 3. ♋	a.	2. . . Cordatis fl. luteo, R. 4. L. 19.

3. Mex-

Habitus	Cultuure	
F. ♐	d.	3. Mexicana altiss. facie heliotropi, R. 5. L. 15.
F. ♌	d.	4. Afr. fol. schorodonea fl. violaceo, R. 6. L. 21.
F. ♌ †	d.	5. . . . . . . amplo infastigium Convolutæ.
F. ♋	c.	6. . . frutescens fl. magno aureo, R. 7. L. 22.
P. 2. ♋	b.	7. Fol. dentato pinnato asperis, L. 26.
F. δ †	d.	8. . . Cordato sagittatis dentatis, R. 10. L. 18.
F. ♋	b.	9. Major hispanica fl. albo, B. 2.
		10. Tricolor variegato, B. 3. M. 4.
		11. Latifol. fl. ex luteis varieg. B. 4.
		12. . . . . magis undulatis, B. 17. L. 5.
P. 1. ♌	a.	13 Fol. serrates sinuatis, R 17. L. 13.
F. ♋	b.	14. Arborea trilobatis & quinque Lobatis quasi pinnatis fl Cæruleo.
		15. Fol. linearibus lanceolatis, L. 1.
		16. Arborea fol. Compositis pinnatis.
		17. Major fol ex albo varieg. M. 3.
		18. Angustiss fol. Linea aureo striato.
		19. Officinarim, L. 4.

SAMBUCUS, Fr. *Sureau*, Eng. *Elder tree.*

Habitus	Cultuure	
A. 4. ♉	a.	1. Racemosa Rubra, R. 2. M. 4. L. 4.
A. 4. ♉ †	a.	2. Fol Eleganter varieg. M 6. B. 6.
		3. Apii folio, M. 5. L. 3. *γ.*
		4. Fructu ex viridi albo, M. 3.
P. 8. δ †	a.	5. Humilus vel Ebulis, L. 1. M. 7.

SANGUINARIA, Eng. *Puccoon.*

Habitus	Cultuure	
P. ½. ♈	b.	1. Minor fl. simplici, M. 1. L. 1. æ. *Sanguisorba v. Pimpinella. 2*

SANTOLINA, Fr. *Garderobe*, Eng. *Lavender Cotton.* *v. Coma aurea.*

Habitus	Cultuure	
F. ♋ †	b.	1. Fol. villosis incanis fl. aureo majore, B. 2.
		2. . . teretibus quadrifariam dentatis, L. 1. fl. aureo.
		3. . . obscure virente fl. aureo, B. 3.
		4. . . . . . . sulphureo.
		5. . . . minus incanis fl. aureo, B. 4.
		6. . . . . . . sulphureo.

Habitus	Cultuure	
		7. Hispanica fol vermiculato fl. aureo, B. 11.
		8. Tomentoso fol. oblongis, R. 6. *filago*, *L.* 2.
F. ♋ †	b.	9. Agerati fol. B. 8. *Chrysanthemum*, *R.* 7. *L.* 14.
		10. Caule Cinereis fol. viridis quadrifariam dentatis.

SAPINDUS, Eng. *Soapberry.*

F.	f. o. x.	1. Fol. Costæ alatæ inascentibus, L & M. 1.

SAPONARIA, Eng. *Soap-wort.* v. Lychnis

P. 3. ♋	a.	1. Fl. pleno, R. 1. Lychnis, B. 36.
P. $\frac{1}{2}$. ♉	a.	2. Caulibus dichotomis procumbentibus, L. 3. R. 6.

SATUREJA, Fr. *Sarriete*, Eng *Savory.* add. Marum

P. 1. ♎ †	a.	1. Fl. in pediculis ramosis, R. 2. L. 6.
P. 1. ♋	a.	2. Cretica fol. rigidis brevi Crasso, R. 4. L. 3.
P. $\frac{1}{2}$. ♌	b.	3. Spicata, L. 2. R 3.
P. 1. ♋	a.	4. Montana, M. 2.

SAURURUS, Eng. *Lizards-tail.*

P. 1. ♍ †	c. o. x.	1. Fol. profundo Cordatis, R. 2. L. 1.

SAXIFRAGA.

P. 1. ♊ †	a.	1. Fl. albo pleno, B. 2. M. 2.
P. $\frac{1}{2}$. ♊	a.	2. Procumbens fol. linearib. integris & trifidis, R. 6. L. 30. æ.
		3. . . . . . trifidis & quinqui fidis, R. 7. L. 30. β.
P. 2. ♋ †	a.	4. Sedi folio multiflora, B. 7. L. 1. γ.
		5. . . . . angustiore serrato, R. 1. L. 1. ε.
P. 1. ♋ †	a.	6. . . . . subrotundis serratis, B. 9. L. 1. β.
		7. Pistillo fl. pallido, L. 12.
		8. . . . rubro, L. 12.
		9. Fol. Cordato ovalibus Crenatis Corollis albis, L. 10.

Habitus	Cultuure	
		SCHABIOSA, Fr. *Schabieuse*, Eng. *Scabious.*
F. ♄ †	c.	1. Afr. frutescens fl. roseo, R. 7. M. 10. L. 14. æ.
F. ♄ †	c.	2. . . . . . fol. lanceolatis integris, R. 8. L. 15. æ.
F. ♄ †	c.	3. . . . . . . rigido serrato splendente fl. albo, L. 3. β.
F. ♄ †	b.	4. . . . . . . linearibus fl. roseo, L. 13.
P. 2. ♌ †	a.	5. Fl. globoso niveo, L. 10. β.
		6. . . . . . rubro, L. 10. β.
P. 3. ♌	a.	7. . . . . . albo maxima, L. 10. æ.
F. ♄ †	c.	8. Afr. frutescens floribus ad Cæruleam inclinantibus, M. 14.
		SCHILLA, Eng. *Squill.* add. Hyacinthus, Lilio Hyacinthus.
B. 2. ♍	c.*	1. Radice rubra, R. 1. M. 1. L. 1. æ. Schinus v. Nelle
		SCHLAREA, Fr. *Toute bonne*, Eng. *Clary.*
P. 3. ♌	a.	1. Lanuginosa ampliss. fol. M. 2.
P. 3. ♌ ↔ †	a.	2. Orient. betonicæ fol. spica longissima purpureis.
		SCHROPHULARIA, Fr. *Scrofulaire*, Eng. *Figwort.*
P. 3. ♋ ↔ †	b.	1. Hispanic. sambuci fol glabra, R. 4. M. 3. L. 8. æ. *fl. rubro luteo vario pulchro.*
P. 2. ♄ †	b.	2. Fol. pinnatis ruta Caninæ dicta, R. 5. L. 9. M. 5.
P. 2. ♋	b.	3. Laserpitii massiliensis folio, M. 6.
P. 2. ♋	a.	4. Orient. foliis Cannabinis, M. 18. L. 6.
		SCUTELLARIA, Fr. *Latoque*, Eng. *Scullcap.*
P. ½. ♋ †	c.	1. Fol. pinnatis fl. luteo, R. 1 L. 1. æ.
P. ½. ♋ †	b.	2. Alpina supina fl magno Cæruleo, R. 3.
P. 1. ♄	c.	3 Fol. Cordato fl. albo, R. 5. L. 12.
P. 2. ♋ †	a.	4. . . . . . . oblongo fl. purp. R. 6. L. 11.
P. 1. ♋	a.	5. . . lanceolato dentato fl. albo, B. 5 L. 4.
		6. . . . . Cæruleo, R. 2. L. 4.

Habitus Cultuure

SEMPERVIVUM v. SEDUM, Fr. *Joubarbe*, Eng. *Houſleek*. adde Anacamps.

F. ♍ ♓ † d. *ſ.* 1. Majus arboreſcens, M. 10. *ſemper vivum*, *R.* 1. *L.* 1.

F. d. *ſ.* 2. Eadem fol. ex albo varieg. M. 11.
3. . . . . pallide luteo varieg.

P. 2. ♍ d. *ſ.* 4. Canarinum omnium maximum, M. 12. *ſemper vivum*, *R & L.* 2.

P. ½. ♋ † a. 5. Montanum tomentoſum, M. 2. *ſemper vivum*, L & R. 5.

P. ½. a. 6. Criſpum & monſtroſum, M. 19. B. 14.

P. ½. ♋ † a. 7. Alpinum minus fl. Eleg. rubro, M. 24. *ſemper vivum*, *L.* 6.

P. ½. ♋ † a.
8. Globulis decendentibus, M. 8. *ſemper vivum*, L & R. 4.
9. Minus luteo fol. acuto, R. 4. L. 9. *β.*
10. Cæpæum dictum, R. 3. L. 7. *perenni.*
11. Minus tereti fol. album, R. 6. L. 10.
12. Parvum acre fl. luteo, R. 45. L. 9. æ.

SELAGO v. Camphorata

SENECIO, Fr. *Senecon*, Eng. *Groundſel.* v. Cacalia.

F. ♌ † o. 1. Afr. fol. retuſo, B. 5. *Solidago*, *R.* 6.

R. 2. ♉ † e o. x. 2. Jacobea fol. radice lignoſa, *China officinarum dictus*, R. 8. L. 3.

SERAPIAS v. Helleborine.

~~SERPILLUM v. Thymus.~~

SERRATULA, Eng. *Saw-wort.*

P. 2. ♋ a.
1. Fl. purpureo, R. 1. M. 1. L. 1. æ.
2. . . Candido, M. 2. L. 1. æ.

P. 2. ♋ † b. 3. Anguſto plantaginis fol. fl. Eleg. purp. M. 4.

SESELI, Eng. *Wild-ſpignel.*

P. ♋ a. 1. Ferula facie tenui fol. B. 3. M. 3.

SIDERITIS, Fr. *Crapaudine*, Eng. *Iron wort.*

F. ♋ d. 1. Fruticoſa fol. lanceolatis linearibus, L. 3. *β.*

SILENE.

F. ♋ b. 1. Fruticoſa myrti fol. fl. rubro, R. 7. L. 9.

SIL-

Habitus	Cultuure	
		SILPHIUM.
P. 4. ♍	a.	1. Fol. ternatis, R. 2. L. 5.
		SISYRINCHIUM. adde Bermudiana.
B. 1. ♌ †	d.*	1. Afric. iridis fol fl. ſpicato albo.
		2. . . . . . . Cæruleo.
B. 2. ♌ †	d.*	3. . . . . . . purpuro vireſcente maculis atro purpureis.
B. 3. ♌	d.*	4. . . maximo fl. parvo lilaci Colore.
		SMILAX, Eng. *Bindweet.*
		1. Aſpera fol. Cordato oblongo, R. 2. L. 1.
F.	b.	2. . . . . . . acuto, R. 2. L. 1.
		3. . . . . . amplisſimo, L. 8.
		SMYRNIUM, Fr. *Maceron*, Eng. *Alexanders.*
P. 4. ♌	a.	1. Caulibus ternatis petiolatis, R. 2. L. 2.
		SOLANUM, Fr. *Morelle*, Eng. *Nightſhade.*
F. ♍	c. o.	1. Amer. fruteſc. ſpiniferum ſpinis igneis, M. 9. L. 22.
F. ♉ †	d.	2. Pomifer. fol. profundo lacineato, R. 8. L. 19. M. 12.
F. ♉ †	d.	3. . . . tomentoſo incano Caule ſolo ſpinoſo, R. 12. L. 21.
F. ♌ †	e.	4. Lignoſum fl. Cæruleo amplo lauri folio, R. 7. L. 2.
F.	d.	5. Afr. ſchandens hederæ folio.
F. ♉ †	b.	6. Schandens fol. ex albo varieg. M. 6.
F. ♉ †	b.	7. . . . latifolio ex aureo varieg.
F. ♌	e.	8. Lignoſum fol. laurini Caule atro viridi fl. albo.
F. ♉	c.	9. Fruteſcens fol. retuſo fructu Ceraſino, R. 6. L. 3.
F. ♉ †	e.	10. Amer. fol. querci effigui fl. Cæruleo, L. 6.
F. ♌ †	c.	11. Inermis fol. oblongo ovato ſinuatis utriumque glabris floribus alaribus.

Haibtus Cultuure

F. ♌ e. 12. Spinosum fol. querci effigui, *schinschunda dicta.*

F. ♌ e. 13. Indicum fruticosum *scheruschunda dicta.*

SOLIDAGO v. Senecio: Virga aurea. Jacobæa

SOLDANELLA, Fr. *Soldanéle.*

P. ½. ♈ † a. 1. Alpina, L. R. & M. 1.

SOPHORA v. Corallod.

SORBUS, Fr. *Sorbier*, Eng. *Service.*

F. ♊ b. 1. Virginiana arbuti fol. Mespilus, L. 3. R. 3.

A. 4. ♊ † a. 2. Sativa fr. magno ovato medio rubento, M. 4.
3. . . . . mali formi utriumque Compresso & rubento.
4. Aucuparia, M. 10. R & L. 1.

SPARTIUM, Eng. *Broom.* adde Genista

F. ♌ a. 1. Fl. luteo, R. 2. L. 3.

SPIRÆA. adde Aruncus. Filipendula.

A. 4. ♋ † a. 1. Opuli fol. R. 2. M. 2. L. 6.

F. ♊ † a. 2. Hyperici fol. R. 3. L. 3. M. 3.

F. ♉ † a. 3. Salice fol. fl. roseo, R. L. & M. 1.

F. ♉ † a. 4. . . . albo spica amplissimo.

F. ♋ † a. 5. Hyperici fol. Crenato fl. albo, L. 5. M. 4.

F. ♋ † a. 6. Virg. fol. lanceolatis obtusus Crenato fl. rubro spicato amplo.

STACHYS, Eng. *Base horehound.*

F. ♌ c. 1. Canariensis frutiosis verbasci fol. M & R. 5.

STAPELIA v. asclepias.
STAPHYLÆA v.

STAPHYLADENDRON, Fr. *Nez Coupez*, Eng. *Bladder nut.*

A. 4. ♋ a. 1. Foliis pinnatis, B & M. 1. *staphylæa*, *R & L.* 1.
2. Virginiana, B & M. 1. *staphylæa*, R & *L* 2.

STATICE v. Limonium.

STYRAX, Fr. & Eng. *Storax.*

A. 4. e. 1. Fol. mali Cotonei, R. L. & M. 1.

STRU-

Habitus	Cultuure	
		STRUTHIA.
F. ♄ †	d.	1. Fol. linearibus, L. syst. Nat.
		SUBER, Fr. *Liege*, Eng. *Cork tree.*
A. 4.	b.	1. Latifolium perpetua virens, B & M. 1. *quercus*, *R.* 5. *L.* 4. 2. Angusti folium, M. 2.
		SYMPHITUM, Fr. *Consoude*, Eng. *Comfrey.*
P. 2. ♄	a.	1. Fl. purpureo fol. ex aureis variegato.
		TABERNAMONTANA.
F.	e.	1. Foliis alternis, L. 3.
		TAMARINDUS, Fr. *Tamarin.*
A. 4.	g. o. x.	1. Officinarim, R & L.
		TAMARISCUS, Fr. *Tamaris*, Eng. *Tamarisk.*
F. ♍ †	a.	1. Narbonensis, M. 1. L. 1. 2. Germanicus, M. 2. L. 2.
		TAMUS, Eng. *Black bryony.*
R. V. ♍	c.	1. Fol. Cordato, L & R. 1.
		TANACETUM, Fr. *Tanesie*, Eng. *Tansy.*
F. ♄	d.	1. Afr. arbor. major, R. 2. M. 5. L. 3. 2. . . frutesc. minor, R. 4. M. 8. L. 2.
P. 2. ♌	a.	3. Vulgare foliis Crispus, L. 7. *β.*
		TARCHONANTOS.
A. 4. ♑	c.	1. Fol. salvia odoræ rosmarini fl. purpuro violaceo, L. 1. M. 1. 2. Fol. latioribus & undulatis.
		TAXUS, Fr. *If*, Eng. *Yew-tree.*
F. ♈	a.	1. Fol. variegatis, M. 3.

Syringa v. Lilac v. Philadelphus

Swertia v. Gentiana

Habitus Cultuure

TETRAGONIA u. TETRAGONOCARPOS.

F. ♄ d. 1. Fol. longo & angusto, M 1. *tetragonia*, L. 1. *R.* 1.
2. Afr. fol. longo lato, M. 2.

P. ½. ♄ d. 3. Fol. portulacæ radice Crassa, M 3. *tetragonia*, L & R. 2.

TEUCRIUM, Eng. *Tree germander*. add. Marum. Polium.

F. ♄ † c. 1. Bæticum fl. violaceo, R. 1. L. 9.
2. . . . . . . fol. variegate, M. 3.

F. ♌ † b. 3. Fl. pallide lutescente, R. 15. L. 20 æ.
4. . . purpureo parvo folio, L. 20. β.

P. ½. ♌ b. 5. Fol. ovatis utriumque acutis fl. Cæruleo, L. 13. R. 16.

P. 1. ♌ † a. 6. Virg. fol. oblongo serrato spica amplissima rubro.

P. ½. ♌ a. 7. Fol. ovatis inciso Crenatis fl. albo, R. 17. L. 19. æ.

THALICTRUM, Eng. *Meadow rue*.

P. ½. ♋ a. 1. Minimum mont. atrorubens, R. 5. L. 1.

P. 1. ♊ † a. 2. Minus radice grumoso, fl. albo majoribus R. 7. L. 3.

P. ½. ♋ a. 3. Minimum fætidissimum, R. 4. L. 2.

P. 3. ♋ † a. 4. Aquilegiæ fol. staminibus albis, B. 1. M. 3.
5. . . . . . . purp. R. 1. L. 12.

P. 4. ♋ a. 6. Prætensis angusti folio, B. 9 M. 13.
7. . . . . anguştissimo fol. R. 3. L. 9.

P. 5. ♋ † a. 8. Majus staminibus luteo, glauco fol. L. 4. R. 6.

THEOBROMA, Fr. *Cacao*.

F. f. o. 1. Fol. serratis, L. 2. *guazuama ulmifolia*.

THUYA, Fr. *Arbre de vie*, Eng. *Tree of live*.

A. 4. ♈ a. 1. Vulgaris theophrasti, R, L & M. 1.

2. Chi-

Habitus	Cultuure	
A. 4. ♈	a.	2. Chinensis fructu Cæruleo subrotundo, L & R. 2. M. 3. 3. Theophrasti fol. varieg. M. 2.
		THYMUS, Fr. *Thim.*
P. ½. ♊	a.	1. Odoratus fl. albo, *serpillum*, M. 8. 2. Fol. variegato, *serpillum*, M. 9. 3. Hirsutissimum, *serpillum*, M. 6.
		TINUS, *vel laurus tinus*, Fr. *Laurier fin.*
A. 4. ♉ †	b.	Viburnum, L. 1. — 1. Primus Clusi fol. atro viridi splendento amplo flore, M. 4. *Viburnum L.* 2. Eadem fol. varieg. M 6. 3. Secundus Clusii fol. sua hirsutis fl. extus roseis, M. 2. TOURNEFORTIA v. *Pittonia*. 4. Tertius Clusii fol. minoribus, M. 3.
A. 4.	a.	5. Virgin. fol oblongo ovato, M. 7. *Viburnum*, *L.* 4. TRADESCANTIA v. *Ephemerum*.
		TRAGACANTHA, Fr. *Barberenard*, Eng. *Goatsthorn.*
F. ♊	b.	1. Fol. non deciduis fl. albo, R. 1.
		TRIFOLIUM. *add. Lupinaster.*
F. ♉ †	d.	1. Afr. fruticans fl. purpurascente, R. 5. *psoralea*, *L.* 4. β. 2. Eadem fl pallescente *psoralea*, *L.* 4. β.
P. 2. ♌ †	a.	3. Mont. spica longiss. rubente, R. 18. L. 17.
E. ♉ †	d.	4. Afr. frutic. fl. Eleg. Cæruleo, *psoralea*, *L.* 4. α.
P. 1. ♌ †	a.	5. Mont. spadiceum suevicum.
		TRICHOMANUS, Fr. *Politric*, Eng. *Maidenhair.*
P. ½. ♊	a.	1. Fol. pinnatis.
		TRIUMPHETTA.
F. ♍ †	f. e. x.	1. Fol. subrotundo dentato, R&L. 1.

TUR-

TROLLIUS v. *Helleborus*.

Habitus Cultuure

T U R N E R A.

F. ♄ † f. o. x. 1. Petiolatis floriferis, R & L. 1. H. C. tab 10.

TUSSILAGO, Fr. *Pas d'ane*, Eng. *Colts foot.*

P. ½. ♉ † b. 1. Alpina rotundi fol. glabro fl. purp. R. 2. L. 2. æ.

TULIPA, Fr. *Tulipe*, Eng. *Tulip.*

B. 1. ♉ a. 1. Præcox luteo, L. 1.

B. ½. ♉ ½. † a. 2. Fl. Coccineo puniceove rutilante, T. L. 3.

B. ½. & 1. ♉ † a. 3. Printanieres. Dont on trouve chez nous une Collection nombreuse dans toute fortes des Couleurs.

B. 1. & 1½. ♊ † a. 4. Fl. pleno. Des quelles on peut avoir un assortiment de 50 Especes differentes.

B. 2. & 2½. ♊ † a. 5. Tardives. Dont on trouve ci aprez un denombrement des plus beaux Especes qui sont Connue Jusq'ici en Europe tant des Bisarrées, Baguettes, Rigaux & d'autres Especes le plus Curieux.

ULEX, Fr. *Genet epineux*, Eng. *Furze or Whins.*

F. ♉ † a. 1. Fl. luteo, L. 1 M. 1.

F. ♋ † e. 2. . . rubro, L. 2. M. 2. *kaapse bassegaay boom.*

ULMUS, Fr. *Orme*, Eng. *Elm tree.*

A. 3. ♈ a. 1. Fol. Eleganter varieg.

URENA, Eng. *Indian Mallow.*

F. ♎ f. { 1. Fol. angulatis, L. 1. 2. . . sinuatis multifidis villosis, L. 2.

URTICA, Fr. *Ortie*, Eng. *Nettle.*

F. c. 1. Chinensis fol. subtus argenteis, L. 12. M. 9.

V A L E R I A N A.

P. 1. ♉ † a. 1. Fol. infimis integris proximis lacineatis, R. 1. L. 6.

P. 3. ♊ † a. 2. . . omnibus pinnatis, R. 2. L. 5.

3. Fol.

Habitus Cultuure

P. 2. ♂ † a. { 3. Fol. lanceolatis fl. rubro, R. 7. L. 3.
4. . . . . albo, R. 7. L. 3.

VERATRUM, Eng. *White hellebore.*

P. 3. ♌ a. 1. Fl. atro rubento, L. 2.

VERBASCUM, Fr. *Boillon blanc*, Eng. *Mullein.* add Cortusa.

P. 3. ♌ † a. { 1. Perennis nigrum fl. albo, T.
2. . . . . . luteo, T.

VERBENA, Fr. *Verveine*, Eng. *Vervain.*

P. 4. ♂ † e. 1. Amer. altiss. fl. Cæruleo, R. 2. L. 10. M. 4.

P. 1. ♂ † f. 2. Fol. obtuse ovalibus spica carnosa nuda, L. 2. R. 6.

P. 2. ♌ a. 3. Canadensis urtici folio, R. 3. L. 11.

VERONICA, Fr. *Veronique*, Eng. *Speedwel.*

P. 3. ♌ † a. { 1. Virg. altiss. spica multiplici fl. Candido, R. 1. L. 1. M. 7.
2. . . . fol Eleg. dentatis spica multiplici fl. Candido.

P. 1. ♋ † a. 3. Austriaca fol. magis dissectis fl. pulchro Cæruleo, M. 15. L. 13.

P. 1. ♋ † a. 4. Fol. oppositis dentatis fl. Cæruleo, L. 8.

P. 2. ♌ † a. { 5. . . . Caule erecto fl. Cæruleo, L. 6.
6. . . lanceolatis ternis fl. Cæruleo, L. 4.
7. . . . . . latiore fl. Cæruleo, L. 4.

P. 1. ♂ † a. 8. . . oppositis crenatis sub incanis fl. Cæruleo, L. 5.

VIBURNUM. adde Opulus - Tinus.

F. ♂ e. 1. Amer. urtice fol. non spinosa, *Lantana*, *R.* 1. *L.* 3. fl. albo.

E. ♂ † e. { 2. . . . . fl. miniatis, *lantana*, *R.* 2. *L.* 4.
3. . . . . . *lantana*, *L.* 4. *fl. primo luteo deinde purpureo.*

F. ♂ † a. { 4. Fol. Cordato fl. albo, L. 5. M. 1.
5. . . . Eleg. varieg. M. 2.

P 6. Amer.

Habitus	Cultuure	
F. ♄ †	a.	6. Amer. aceris fol. fl. Cæruleo, L. 6.
E. ♎	c.	7. Salviæ fol. fl. Corymbosis, *olim Wachendorphia, Lantana*, L. 6.
Ė. ♄ †	f.	8. Fol. ternis fl. Cæruleo spicato, *Lantana*, *L.* 1.

VIOLA, Fr. *Violette*, Eng. *Violet.*

P. 1. ♄	b.	1. Fruticosis, R. 1. L. 10.
P. ½. ♈ †	a.	2. Martia fl. purp. pleno. L. 8. γ.

VIRGA AUREA, Fr. *Verge dorée*, Eng. *Golden rod.*

P. 8. ♌ †	a.	1. Altiss. paniculis nonnunquam reflexo, B 5. solidago, L. 3.
P. ½. ♋	a.	2. Omnium minimum, B. 14.
P. 2. ♌ †	a.	3. Mexicana limoni fol. B. 11. *solidago*, *R.* 1. *L.* 6.
P. 3. ♌	a.	4. Montana latiore fol. glabro, B. 2. *solidago*, R. 4.
P. 4. ♋ †	a.	5. Angusti fol. panicula speciosa, B. 6.
P. 2. ♌ †	a.	6. Minus fol. lato serrato.
P. 3. ♌	a.	7. Fol. lato dentato Caule purpurascente.

VITEX, Fr. *Agnus*, Eng. *Chaste tree.*

A. 4. ♎ †	a.	{ 1. Fl. purpureis, R. 1 L. 1. 2. . . albo, B. 3. M. 3. L. 1.

VITIS IDÆA, Fr. *Airelle*, Eng. *Bilberry.*

A. 4. ♉	c.	1. Africana fol. rotundo serrato *Myrsine*, *L* 1. *myrtus afr fl. rubro.*

VITIS, Fr. *Vigne*, Eng. *Vine.*

V.	a.	1. Quinqui fol. Canadensis, M. 5. R. 3. *hedera*, *L.* 3.
V. ♋	a.	{ 2. Fol. apii, vinifera, R. 2. L. 6. 3. Virg. vinifera fol. Cordatis, L. 4.

VOLKAMERIA.

E.	f. •.	1. Spinis petiolorum rudimentis, L. 1.
F. ♍ †	f. •.	2. Inermis, L. 2. *fl. albicante tubiformi Elegans.*

WA-

Habitus	Cultuure	
		WACHENDORPHIA.
P. 3. ♍ †	d.*	1. Afr. palmæ fol. fl. amplissimo, aureo.
		YUCCA.
F. ♍ †	b.	1. Fol. alœs, L. 1. M. 1. *Cordyline*, *R.* 3.
F. ♍ †	c.	2. . . . . . margine Crenulato, L. 2. M. 3. *Cordyline*, *R.* 1. *aloë*, *B.* 11.
P. 4. ♍ †	b.	3. . . . . . filamentosis, L. 4. M. 2.
^		ZANTOXYLON, Eng. *Tooth-ach tree.*
A. 4.	a.	1. Spinosum fol. pinnatis, M. 1. L. 1.
		ANONYMÆ. Zygophyllum v. Fabago.
F.	f. *o. x.*	Arbor americana Carica simils.
F.	f. *o. x.*	An Jasminum malabaricum, *Genipa*, ou Comme il a ete autrefois cité an *apocynum fol. ternis.*
F	f o x	an Cytisus afr. fol. pinnatis pubescentibus
F	f o	an Coronilla fol. pinatis [illegible] africa

^ WATSONIA. 1. Meriana

1. Watsonia Mill. T. 266.
2. — humilis fol. linearienssif. tubo flori longius. Mill. T. 297. 2

On trouve auſſi chez nous Les plus exquiſe Eſpeces des Vignes ſuivantes.

Blanches,	Vander Laan.	*f* 1	10
	Vosholſe.	*f* 1	10
	Diamant.	*f* 1	10
	Parel druyf.	*f* 1	10
	Geel rand, raamborger wit. .	*f* 1	10
	Vaſte Waterzoet. . . .	*f* 1	
	Loſſe lypſiger. . . .	*f* 1	
	Muſcadelle.	*f* 1	
Bleues,	Lange franquendaler. . .	*f* 1	
	Ronde franquendaler. . .	*f* 1	
	Vin tinct.	*f* 1	
	Bleue avant.	*f* 1	
	Catalonier.	*f* 1	10
	Parel druyf.	*f* 1	
	Muſcadelle.	*f* 1	

Comme auſſi des Racines d'aſperges du meilleur eſpeces.

d'Une année le Centaine .	*f* 1	5
De deux années le Centaine .	*f* 1	10

Et d'ailleurs une tres grande Collection de Semences à fleurs ou des plantes annuelle des quelles on peut avoir un Catalogue ſeparate.

VER-

VERKLARING

Der Letteren en Tekenen ſtaande op de eerſte Colomme, te kennen gevende de hoedanigheden der gewaſſen.

A.1. Betekent, Bomen welke tot de grootſte hoogte opſchiete.

A.2. . . . . Bomen van de twede hoogte.

A.3. . . . . Bomen van de derde hoogte.

A.4. . . . . Bomen van de vierde hoogte, of zulke die 't laagſt waſſen.

F. . . . . Heeſters, of ſtruelagtige gewaſſen.

P.$\frac{1}{2}$. . . . . Planten welker bloemſtenge of gewas maar omtrent $\frac{1}{2}$ voet hoog opſchiete.

P.1. . . . . Planten wier gewas tot omtrent 1 voet hoog werd.

P.2.
P.2.
P.4.enz. } . . . . Planten welker ſtengen tot 2. 3. 4. of meer voeten ordinair opſchieten.

V. . . . . Klimmende en zig omwindende gewaſſen.

B.$\frac{1}{2}$. . . . . Bol gewaſſen niet hoger dan een halve voet waſſende.

B.1.
B.2.enz. } . . . . Bol gewaſſen wier ſtengen, tot 1. 2. enz. voet opſchiete.

R.$\frac{1}{2}$. . . . . Wortel of klaauw gewaſſen, tot 6 duym hoog groeyend.

R.1.
R.2.enz. } . . . . Wortelagtige gewaſſen wier bloemſtengen of gewas tot 1. 2. enz. voeten hoog gemeenlyk komen en haar gewaay des Winters verliezen.

De Tekenen der Dieren-riem geven ten naaſten by te kennen den tyd in welke zy bloeijen.

Zo betekent ♒ Dat zy bloeijen, omtrent January.
♓ — — — — February.
♈ — — — — Maart.
♉ — — — — April.
♊ — — — — Mey.
♋ — — — — Junio.
♌ — — — — Julio.
♍ — — — — Auguſtus.
♎ — — — — September.
♏ — — — — October.
♐ — — — — November.
♑ — — — — December.
♌♐ — van Junio tot November, enz.

♀ Doet kennen die gewaſſen, die 't grootſte gedeelte der Zomer Bloemen dragen, of wel 't gehele jaar door nu en dan bloem geven.

† Betekent Gewaſſen, welke fraije en cierlyke Bloemen geven.

VERKLARINGE

Der Letteren en Tekenen der tweede Colomme te kennen gevende op hoedanige wyze behandelt, en 's winters konnen bewaard werden.

a. Geeſt te kennen die gewaſſen welke zonder enige dekkinge onze winter koude verduuren en in vollen grond overblyven.

b. - - - - de zulke die in de koude grond overblyven, dog des Winters, met ſtro, matten, of droge boom bladeren moeten gedekt worden.

c. - - - - die gene die in een ordinair Orange huys, kamer of ander vertrek konnen werden bewaard, alleen maar zorg dragende dat niet bevriezen.

d. - - - - die ingelyks in een bovengemeld vertrek konnen overwinteren, dog digt voor de glazen moeten werden geſtelt, of op een plaats daar de zon en verſſe lugt genieten konnen.

e. - - - - die in een kas in welke des winters een weinig geſtookt werd, moeten werden bewaard

f. - - - - die in een kas gehouden, en gelyke warmte als de Annanasſen genieten moeten.

g. - - - - die gene die wel de grootſte warmte vereiſſen.

o. - - - - die 't gehele jaar binnen de bakken of kaſſen eiſſen gehouden te worden, alzo ons Climaat niet verdragen.

x. - - - - die in het voorjaar op den broeybak moeten geſtelt en aan den groey gebragt werden.

ſ. - - - - die des winters zeer weinig water moeten gegeven werden.

ſſ. - - - - dezulke welke in 't geheel des winters geen water behoeven te ontfangen.

*. - - - - africaanſe bollen of planten, welke in den vollen gront geplant, en des winters met glasramen gedekt zynde en voor alle vorſt bewaard werdende, veel gewilliger bloeijen als dat dezelve in potten geplant, en des winters in 't Oranje huys bewaard werden.

De

De letteren agter de benaminge der Planten, geven te kennen de Autheurs by welke dezelve op de daar bygevoegde nummers zyn te vinden.

Als B. Boerhaven, index alter plantarum, lugduni batav. 1720.

R. A. van Roijen, flora Leydenſis prodromus lugduni batav. 1740.

L. C. Linnæi, ſpecies plantarum holmiæ, 1753.

M. P. Miller gardeners, dictionary ſixt edition London, 1752.

T. Z. J. Burmanni, theſaurus Zeylanicus, Amſtelædami, 1737.

B. D. J. Burmanni, decades plantarum africanarum, amſtelædami, 1738.

T. Tournefort, inſtitutiones rei herbariæ, paris, 1719.

C. C. Commelinus, icones plantarum lug. batav. 1716.

C. H. Horti Cliffortiani.

Parceque pluſieurs Amateurs des Païs Etrangères ſe m [illegible] quelques fois touchant le temps du tranſport; nous avons jugé à propos d'y joindre une petite direction, à l'egard du temps le plus propre pour tranſporter les Plantes.

Les Arbres ſe depoillent & le pluspart des Plantes de pleine terre, doivent être tranſportées, pendant les Mois de Février ou Mars, en Printemps, ou aux Mois d'Octobre & Novembre dans l'Automne.

Les Arbres & Plantes des Serres doivent être tranſportées aux Mois d'Avril, May ou Septembre.

Les Oignons pendant les Mois d'Aout, Septembre & Novembre ſuivant l'étendue du Chemin.

Аф9.